


Skript zur Vorlesung

Funktionalanalysis

Sommersemester 2009

Robert Denk



Universität Konstanz

Fachbereich Mathematik und Statistik

Stand: 3. 8. 2009

Inhaltsverzeichnis

1	Topologische und metrische Räume, Kompaktheit	1
	a) Topologie und Metrik	1
	b) Kompaktheit	5
2	Normierte Räume und Hilberträume	9
	a) Normierte Räume und Banachräume	9
	b) Hilberträume	14
	c) Der Approximationssatz und der Satz von Riesz für Hilberträume	16
	d) Orthonormalbasen	18
3	Lineare Operatoren: Grundbegriffe	24
	a) Operatoren und Spektrum	24
	b) Eigenschaften der Resolventenabbildung	27
4	Dualräume und adjungierte Operatoren	31
	a) Dualräume und Reflexivität	31
	b) Adjungierte Operatoren in Banachräumen	33
	c) Adjungierte Operatoren in Hilberträumen	34
5	Distributionen und Sobolevräume	38
	a) Distributionen	38
	b) Sobolevräume: Definition und erste Eigenschaften	41
	c) Wichtige Sätze aus der Theorie der Sobolevräume	44
6	Klassische Sätze der Funktionalanalysis	48
	a) Der Satz von Baire	48
	b) Hahn-Banach-Sätze	52
7	Nützliches über das Spektrum	56
8	Der Spektralsatz für selbstadjungierte beschränkte Operatoren	63
	a) Stetiger und messbarer Funktionalkalkül	63
	b) Orthogonale Projektionen	70
	c) Projektorwertige Maße und der Spektralsatz	73

9	Eigenschaften der L^p -Räume	83
	a) Die Faltung	83
	b) Vollständigkeits- und Dichtheitsaussagen	85
10	Die Fourier-Transformation	89
Literatur	95
A	Index	96

1. Topologische und metrische Räume, Kompaktheit

a) Topologie und Metrik

Wir starten mit der Definition einiger grundlegender Begriffe der Topologie. Eine Topologie ist ähnlich wie eine σ -Algebra ein Mengensystem.

1.1 Definition. Sei $X \neq \emptyset$ eine Menge; $\mathcal{P}(X)$ bezeichne die Potenzmenge von X .

a) Ein Mengensystem $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ heißt eine Topologie auf X , falls gilt

(i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$,

(ii) Falls $A, B \in \mathcal{T}$, so ist auch $A \cap B \in \mathcal{T}$,

(iii) Falls I eine Indexmenge ist und $A_i \in \mathcal{T}$ ($i \in I$), so ist auch $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{T}$. In diesem Falls heißt (X, \mathcal{T}) ein topologischer Raum.

b) Seien (X_1, \mathcal{T}_1) und (X_2, \mathcal{T}_2) topologische Räume. Dann heißt eine Abbildung $f: X_1 \rightarrow X_2$ stetig, falls $f^{-1}(\mathcal{T}_2) \subset \mathcal{T}_1$. Die Abbildung f heißt offen, falls für alle $U \in \mathcal{T}_1$ gilt $f(U) \in \mathcal{T}_2$. Die Abbildung f heißt ein Homöomorphismus, falls f bijektiv ist und f und f^{-1} beide stetig sind.

c) Sei $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$. Dann heißt die kleinste Topologie, die \mathcal{U} enthält, die von \mathcal{U} erzeugte Topologie $\mathcal{T}(\mathcal{U})$.

d) Sei I eine Menge und (Y_i, \mathcal{T}_i) topologischer Raum für $i \in I$. Sei $F = \{f_i: X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$ eine Familie von Abbildungen. Dann heißt die kleinste (größte) Topologie auf X , für die alle $f \in F$ stetig sind, die F -schwache Topologie $\mathcal{T}(F)$ auf X . Es gilt

$$\mathcal{T}(F) = \mathcal{T}\left(\{f_i^{-1}(U_i) : U_i \in \mathcal{T}_i, i \in I\}\right).$$

e) Sei $X = \prod_{i \in I} X_i$ das kartesische Produkt, wobei (X_i, \mathcal{T}_i) ein topologischer Raum für $i \in I$ ist. Sei $\text{pr}_i: X \rightarrow X_i$ die Projektion auf die i -te Komponente. Dann heißt $\mathcal{T}(\{\text{pr}_i : i \in I\})$ die Produkttopologie auf X .

1.2 Bemerkung. a) Die erzeugte Topologie $\mathcal{T}(\mathcal{U})$ ist das System aller Mengen der Form $\bigcup_{i \in I} \bigcap_{n=1}^N U_{in}$ mit $U_{in} \in \mathcal{U}$, $N \in \mathbb{N}$, I eine Indexmenge.

b) Man beachte die Ähnlichkeit zur Definition einer σ -Algebra. Bei einer σ -Algebra \mathcal{A} gilt statt a) (iii) nur

$$A_n \in \mathcal{A} \quad (n \in \mathbb{N}) \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A},$$

dafür ist mit einer Menge A auch $X \setminus A$ in der σ -Algebra. Viele Begriffe wie die erzeugte σ -Algebra und die Produkt- σ -Algebra sind analog definiert. Es gibt allerdings keine so einfache Darstellung der erzeugten σ -Algebra wie in a).

c) Die kleinste (größte Topologie) auf einer Menge X ist gegeben durch $\mathcal{T}_1 := \{\emptyset, X\}$. Die größte (feinste Topologie) ist gegeben durch $\mathcal{T}_2 := \mathcal{P}(X)$.

1.3 Definition. Sei (X, \mathcal{T}) topologischer Raum.

a) Ein Mengensystem $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ heißt eine Basis der Topologie \mathcal{T} , falls sich jedes Element von \mathcal{T} als Vereinigung von Elementen aus \mathcal{U} schreiben lässt. Ein Mengensystem \mathcal{U} heißt eine Subbasis von \mathcal{T} , falls \mathcal{T} die von \mathcal{U} erzeugte Topologie ist.

b) Eine Menge $U \subset X$ heißt genau dann offen, falls $U \in \mathcal{T}$, und genau dann abgeschlossen, falls $X \setminus U \in \mathcal{T}$. Das Innere $\overset{\circ}{A}$ einer Menge $A \subset X$ ist definiert als die größte offene Menge U mit $U \subset A$. Der Abschluss \bar{A} ist definiert als die kleinste abgeschlossene Menge V mit $A \subset V$.

c) Eine Menge $V \subset X$ heißt eine Umgebung eines Punktes $x \in X$, falls eine offene Menge $U \in \mathcal{T}$ existiert mit $x \in U \subset V$. Eine Familie \mathcal{N} von Teilmengen von X heißt eine Umgebungsbasis des Punktes $x \in X$, wenn jedes $N \in \mathcal{N}$ eine Umgebung von x ist und für jede Umgebung M von x ein $N \in \mathcal{N}$ existiert mit $N \subset M$.

d) (X, \mathcal{T}) heißt Hausdorff-Raum (oder T_2 -Raum), falls für jedes $x, y \in X$ mit $x \neq y$ offene Mengen $U_x, U_y \in \mathcal{T}$ existieren mit $x \in U_x$, $y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$.

e) (X, \mathcal{T}) heißt normal (oder T_4 -Raum), falls (X, \mathcal{T}) Hausdorffsch ist und für alle abgeschlossenen Mengen A_1, A_2 mit $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ offene Mengen $U_1 \supset A_1$, $U_2 \supset A_2$ existieren mit $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Die beiden folgenden Sätze werden hier nicht bewiesen.

1.4 Satz (Lemma von Urysohn). Sei (X, \mathcal{T}) normaler topologischer Raum, und seien $A_1, A_2 \subset X$ abgeschlossen mit $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Dann existiert ein $f \in C(X; \mathbb{R})$ mit $0 \leq f \leq 1$ und $f|_{A_1} = 0$, $f|_{A_2} = 1$.

1.5 Satz (Erweiterungslemma von Tietze). Sei (X, τ) ein normaler topologischer Raum. Sei $M \subset X$ abgeschlossen, $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $f: M \rightarrow [a, b]$ stetig. Dann existiert eine stetige Fortsetzung $F: X \rightarrow [a, b]$ von f .

1.6 Definition. Sei X eine Menge und $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung. Dann heißt d eine Metrik und (X, d) ein metrischer Raum, falls für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(i) $d(x, y) = d(y, x)$

(ii) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

$$(iii) \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

1.7 Beispiele. Einige Beispiele von metrischen Räumen sind:

a) Sei X beliebig und

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$

(diskrete Metrik).

b) Die Standardmetrik auf $X = \mathbb{R}$ oder \mathbb{C} ist gegeben durch $d(x, y) = |x - y|$.

c) Sei $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$. Dann sind

$$d_1(f, g) := \|f - g\|_\infty := \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|,$$

$$d_2(f, g) := \|f - g\|_{L^1} := \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

zwei Metriken auf X .

1.8 Definition. Sei (X, d) ein metrischer Raum.

a) Die (offene) Kugel um x_0 mit Radius $r > 0$ ist definiert als $B(x_0, r) := \{x \in X \mid d(x_0, x) < r\}$.

b) Eine Teilmenge $U \subset X$ heißt offen, falls für alle $u \in U$ ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B(u, \varepsilon) \subset U$. Dies definiert die Topologie \mathcal{T}_d , d.h. jeder metrische Raum ist damit ein topologischer Raum (X, \mathcal{T}_d) .

c) Ein topologischer Raum (X, \mathcal{T}) heißt metrisierbar, falls es eine Metrik d gibt mit $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}$.


1.9 Beispiel. Das folgende Beispiel zeigt, dass nicht jeder topologische Raum metrisierbar ist: Sei X eine Menge mit mindestens zwei Elementen und $\mathcal{T} := \{\emptyset, X\}$. Falls (X, \mathcal{T}) metrisierbar mit Metrik d wäre, so wäre für zwei Elemente $x \neq y \in X$ der Abstand $\gamma := d(x, y)$ positiv und es folgt $B(x, \frac{\gamma}{2}) \in \mathcal{T}_d$. Wegen $\emptyset \subsetneq B(x, \frac{\gamma}{2}) \subsetneq X$ erhalten wir einen Widerspruch.

1.10 Beispiel. Wir greifen das Beispiel 1.7 c) noch einmal auf. Die Identität $\text{id}_X: f \mapsto f$, ist zwar bijektiv, aber die Stetigkeit hängt von der gewählten Metrik ab:

So ist $\text{id}: (C([0, 1]), d_1) \rightarrow (C([0, 1]), d_2)$ stetig, denn es gilt

$$d_2(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| = d_1(f, g).$$

Hingegen ist $\text{id}: (C([0, 1]), d_2) \rightarrow (C([0, 1]), d_1)$ nicht stetig: Definiere zu $n \in \mathbb{N}$ die Funktion f_n wie in folgender Abbildung:



Dann gilt

$$d_2(f_n, 0) = \int_0^1 |f(x)| dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \rightarrow 0,$$

aber: $d_1(f_n, 0) = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = 1$.

Bei topologischen Räumen bzw. metrischen Räumen kann man einige Begriffe definieren, die schon aus der Theorie normierter Räume bekannt sind. Hier einige Beispiele:

1.11 Definition. Sei (X, \mathcal{T}) ein topologischer Raum, $(x_n)_n \subset X$ Folge.

- Ein Element $x \in X$ heißt Häufungspunkt von $(x_n)_n$, falls in jeder offenen Menge, die $x \in X$ enthält, unendlich viele Folgenglieder liegen.
- Ein Element $x \in X$ heißt Grenzwert oder Limes der Folge $(x_n)_n$, falls in jeder offenen Menge, die x enthält, alle bis auf endlich viele Folgenglieder liegen. Man schreibt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n := x$.

1.12 Definition. Seien (X, d_X) , (Y, d_Y) metrische Räume. Dann heißt eine Abbildung $f: X \rightarrow Y$ eine Isometrie, falls

$$d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x, y) \quad (x, y \in X) \quad (1-1)$$

gilt. Eine bijektive Isometrie heißt isometrischer Isomorphismus.

1.13 Beispiel. Versieht man \mathbb{R}^n mit der euklidischen Metrik, so sind die durch orthogonale Matrizen gegebenen Abbildungen Isometrien von \mathbb{R}^n nach \mathbb{R}^n .

1.14 Definition. Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- Eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ heißt eine Cauchyfolge, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Der Raum heißt vollständig, falls jede Cauchyfolge konvergent ist.

b) Eine Menge $A \subset X$ heißt beschränkt, falls ein $r > 0$ und ein $x_0 \in X$ existieren mit $A \subset B(x_0, r)$.

c) Seien $A, B \subset X$. Dann heißt A dicht in B , falls $\bar{A} \supset B$ gilt.

1.15 Beispiel. Sei (X, d) ein metrischer Raum mit diskreter Metrik, und sei $(x_n)_n$ eine Cauchyfolge. Dann existiert ein $x_0 \in X$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n \geq n_0$ gilt: $x_n = x_0$.

1.16 Satz. Sei (X, d) ein metrischer Raum.

a) Es existiert ein beschränkter metrischer Raum (X, d') , welcher homöomorph zu (X, d) ist.

b) Es existiert ein vollständiger metrischer Raum (Y, d_Y) und ein dichter Teilraum $Y_0 \subset Y$ so, dass (X, d) und (Y_0, d_Y) isometrisch isomorph sind.

Beweis. a) Siehe Übung (man wählt $d' = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$).

b) wird hier nicht bewiesen. □

Auch der folgende Satz, der aus der Analysis bekannt sein sollte, wird hier nicht bewiesen.

1.17 Satz (Banachscher Fixpunktsatz). Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum, und $T: X \rightarrow X$ eine Kontraktion, d.h. es existiere ein $k \in [0, 1)$ mit

$$d(Tx, Ty) \leq k \cdot d(x, y) \quad (x, y \in X).$$

Dann existiert genau ein Fixpunkt von T , d.h. genau ein $x^* \in X$ mit $Tx^* = x^*$. Für alle $x_0 \in X$ konvergiert die Folge $(T^n x_0)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen x^* , und es gilt die Abschätzung

$$d(x^*, T^n x_0) \leq \frac{k^n}{1-k} \cdot d(Tx_0, x_0).$$

b) Kompaktheit

1.18 Definition. Sei (X, \mathcal{T}) ein topologischer Raum und $A \subset X$.

a) Eine offene Überdeckung von A ist eine Familie $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ (wobei Λ eine beliebige Indexmenge ist) mit $U_\lambda \in \mathcal{T}$ und $A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$. Eine endliche Teilüberdeckung der offenen Überdeckung $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ ist eine Überdeckung der Form $A \subset \bigcup_{j=1}^n U_{\lambda_j}$ mit $n \in \mathbb{N}$ und $\lambda_j \in \Lambda$.

b) Die Menge $A \subset X$ heißt kompakt, wenn jede offene Überdeckung von A eine endliche Teilüberdeckung besitzt.

1.19 Satz. Seien (X, \mathcal{T}_X) und (Y, \mathcal{T}_Y) topologische Räume. Falls X kompakt ist und $f : (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ stetig, so ist der Wertebereich $f(X)$ kompakt.

Beweis. Sei $f(X) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$ mit $V_\lambda \in \mathcal{T}_Y$. Setze $U_\lambda := f^{-1}(V_\lambda)$. Da f stetig ist, folgt $U_\lambda \in \mathcal{T}_X$, und $X \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ ist eine offene Überdeckung von X . Wegen der Kompaktheit von X existiert eine endliche Teilüberdeckung $X \subset \bigcup_{j=1}^n U_{\lambda_j}$. Dann ist aber $f(X) \subset \bigcup_{j=1}^n V_{\lambda_j}$ ebenfalls eine endliche Teilüberdeckung, und $f(X)$ ist kompakt. \square

1.20 Bemerkung. In $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ gilt: Eine Teilmenge A ist genau dann kompakt, wenn A beschränkt und abgeschlossen ist. In beliebigen metrischen Räumen (X, d) gilt nur eine Richtung: Jede kompakte Teilmenge A ist beschränkt und abgeschlossen, aber nicht umgekehrt, wie das unten stehende Beispiel 1.21 b) zeigt.

1.21 Beispiele. a) Sei X eine unendliche Menge mit diskreter Metrik. Dann ist X beschränkt und abgeschlossen, aber $X = \bigcup_{x \in X} B(x, \frac{1}{2})$ ist eine offene Überdeckung von X , zu welcher keine endliche Teilüberdeckung existiert.

b) Sei

$$X := \ell^2 := \{x = (\xi_1, \xi_2, \dots) : \xi_j \in \mathbb{R}, \sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^2 < \infty\}.$$

Durch

$$d(x, y) := \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j - \eta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

wird eine Metrik auf ℓ^2 definiert. Für die Einheitsvektoren

$$e_j = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{j\text{-te Stelle}}, 0, \dots)$$

gilt $x = \sum_{j=1}^{\infty} \xi_j e_j$ und $d(e_i, e_j) = \sqrt{2}$ ($i \neq j$). Die Einheitskugel $S := \{x \mid d(x, 0) = 1\}$ ist beschränkt und abgeschlossen, aber nicht kompakt.

Denn $S \subset \bigcup_{x \in S} B(x, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ist eine offene Überdeckung von S . Falls eine endliche Teilüberdeckung $S \subset \bigcup_{j=1}^n B(x_j, \frac{\sqrt{2}}{2})$ existiert, so existieren ein $x_0 \in \{x_1, \dots, x_n\}$ und Indizes $i \neq j$ mit $e_i, e_j \in B(x_0, \frac{\sqrt{2}}{2})$. Damit folgt

$$\sqrt{2} = d(e_i, e_j) \leq d(e_i, x_0) + d(x_0, e_j) < \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2},$$

Widerspruch. Also ist S nicht kompakt.

c) Wäre in einem metrischen Raum jede abgeschlossene, beschränkte Menge automatisch kompakt, so wäre jeder metrische Raum kompakt, da jeder metrische Raum homöomorph zu einem beschränkten, metrischen Raum ist.

1.22 Bemerkung. Sei X ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann sind äquivalent:

- (i) Die Menge A enthält alle ihre Häufungspunkte.
- (ii) Es gilt $A = \bar{A}$.
- (iii) Die Menge A ist abgeschlossen.

1.23 Definition. Sei (X, d) metrischer Raum.

- a) Dann heißt X folgenkompakt, wenn jede Folge in X einen Häufungspunkt besitzt.
- b) Der Raum X heißt totalbeschränkt, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine endliche Menge $E \subset X$ gibt mit:

$$X = \bigcup_{x \in E} B(x, \varepsilon).$$

E heißt (endliches) ε -Netz für X .

1.24 Bemerkung. Entsprechendes gilt auch für Teilmengen $A \subset X$, wobei $E \subset X$ ausreicht. Daraus ist $\tilde{E} \subset A$ konstruierbar (Dreiecksungleichung).

1.25 Satz. (X, d) sei metrischer Raum. Dann sind äquivalent:

- (i) X ist kompakt.
- (ii) X ist folgenkompakt.
- (iii) X ist totalbeschränkt und X vollständig.

Beweis. **(i) \Rightarrow (ii).** Angenommen, es existiert eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, welche keinen Häufungspunkt besitzt. Dann existiert zu jedem $x \in X$ ein $\varepsilon_x > 0$ so, dass die Menge $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in B(x, \varepsilon_x)\}$ endlich ist. Durch $X \subset \bigcup_{x \in X} B(x, \varepsilon_x)$ ist eine offene Überdeckung von X gegeben, und da X kompakt ist, existieren ein $m \in \mathbb{N}$ und $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_m \in X$ mit

$$X = \bigcup_{j=1}^m B(\tilde{x}_j, \varepsilon_{x_j}).$$

Insbesondere sind alle (unendlich vielen) x_n in den endlich vielen Kugeln enthalten. Dies ist ein Widerspruch zur Endlichkeit der Menge $\bigcup_{j=1}^m \{n \in \mathbb{N} : x_n \in B(\tilde{x}_j, \varepsilon_{x_j})\} < \infty$.

(ii) \Rightarrow (iii). Als folgenkompakter Raum ist X vollständig. Angenommen, X ist nicht totalbeschränkt. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $\bigcup_{j=1}^n B(x_j, \varepsilon) \subsetneq X$ für alle endlichen Mengen $\{x_1, \dots, x_n\}$. Wähle $x_1 \in X$ beliebig, $x_2 \in X \setminus B(x_1, \varepsilon)$, $x_3 \in X \setminus (B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon))$ usw. Dann gilt $x_{n+1} \in X \setminus \bigcup_{j=1}^n B(x_j, \varepsilon)$. Für alle $x \in X$ liegt maximal ein Element der Folge in $B(x, \frac{\varepsilon}{2})$, da $d(x_n, x_{n+1}) \geq \varepsilon$. Also besitzt die Folge $(x_n)_n$ keinen Häufungspunkt in X , Widerspruch.

(iii) \Rightarrow (i). Wir nehmen an, es gibt eine offene Überdeckung \mathcal{A} von X , welche keine endliche Teilüberdeckung besitzt. Da X totalbeschränkt ist, existieren $n \in \mathbb{N}$ und $y_1, \dots, y_n \in X$ mit $X = \bigcup_{j=1}^n B(y_j, \frac{1}{2})$. Wären alle $B(y_j, \frac{1}{2})$, $j = 1, \dots, n$, endlich überdeckbar, so auch X . Also gibt es $x_1 \in \{y_1, \dots, y_n\}$ so, dass $B(x_1, \frac{1}{2})$ nicht endlich überdeckbar ist.

Wir konstruieren induktiv eine Folge $(x_n)_n$: Seien x_1, \dots, x_n gegeben und so konstruiert, dass $B(x_{n-1}, \frac{1}{2^{n-1}})$ nicht endlich überdeckbar ist, d.h. es gibt $x_n \in B(x_{n-1}, \frac{1}{2^{n-1}})$ mit $B(x_n, \frac{1}{2^n})$ nicht endlich überdeckbar. Da die Abschätzung $d(x_n, x_m) \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ für $m \geq n$ gilt, ist $(x_n)_n$ eine Cauchy-Folge. Wegen der Vollständigkeit von X existiert der Grenzwert $x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$. Da \mathcal{A} eine offene Überdeckung ist, gibt es ein $V \in \mathcal{A}$ mit $B(x, \varepsilon) \subset V$. Dazu existiert ein Index $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $B(x_{n_0}, 2^{-n_0}) \subset B(x, \varepsilon)$, denn für $y \in B(x_n, 2^{-n})$ gilt

$$d(y, x) \leq d(y, x_n) + d(x_n, x) \leq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} < \varepsilon$$

für hinreichend großes n . Somit ist $y \in B(x, \varepsilon)$ und damit $B(x_{n_0}, 2^{-n_0}) \subset V$, Widerspruch. \square

1.26 Bemerkung. a) Eine andere Bezeichnung für „totalbeschränkt“ ist auch „präkompakt“.

b) Eine Menge $A \subset X$ heißt relativ kompakt, wenn \overline{A} kompakt ist.

Der folgende Satz ist einer der wichtigsten Sätze der Topologie; der Beweis (der etwa mit Hilfe von Ultrafiltern geführt werden kann) ist aber zu aufwändig für diese Vorlesung.

1.27 Satz (Tychonov). Sei I eine Menge und $X = \prod_{i \in I} X_i$ das kartesische Produkt der topologischen Räume (X_i, \mathcal{T}_i) . Falls jedes (X_i, \mathcal{T}_i) kompakt ist, dann ist auch X in der Produkttopologie kompakt.

2. Normierte Räume und Hilberträume

Im folgenden sei X ein \mathbb{K} -VR, wobei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

a) Normierte Räume und Banachräume

2.1 Definition. Eine Norm ist eine Abbildung $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, \infty)$ mit folgenden Eigenschaften:

- (i) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ($x \in X$),
- (ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ ($\alpha \in \mathbb{K}, x \in X$)
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ($x, y \in X$)

In diesem Fall heißt $(X, \|\cdot\|)$ normierter Raum. Falls in (i) nur die Richtung „ \Leftarrow “ gilt, so heißt $\|\cdot\|$ eine Halbnorm oder Seminorm.

2.2 Bemerkung. a) Ein normierter Raum $(X, \|\cdot\|)$ wird mit $d(x, y) := \|x - y\|$ zu einem metrischen Raum (X, d) . Die Umkehrung gilt i.A. nicht.

b) Sei (X, d) ein metrischer Raum, so ist $\widehat{d}: X \rightarrow \mathbb{R}, \widehat{d}(x) := d(x, 0)$ eine Norm genau dann, wenn gilt

- (i) $d(x + z, y + z) = d(x, y), \forall x, y, z \in X$
- (ii) $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x, y), \forall x, y \in X, \alpha \in \mathbb{K}$

Wenn dies gilt, dann ist $d_{ind}(\widehat{d}) = d$.

2.3 Definition. Ein Banachraum ist ein vollständiger normierter Raum.

2.4 Beispiele. a) Der Raum $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$, $\|\cdot\| = |\cdot|$ ist ein Banachraum.

b) Sei A kompakter, metrischer Raum und Y Banachraum. Dann ist der Raum $C(A; Y)$ aller stetigen Funktionen von A nach Y , versehen mit der Supremumsnorm $\|f\|_\infty := \sup_{a \in A} \|f(a)\|_Y$ ein Banachraum.

Der Beweis des folgenden Satzes sollte aus der Analysis bekannt sein.

2.5 Satz. Seien X, Y normierte Räume, $T: X \rightarrow Y$ linear. Dann sind äquivalent:

- (i) T ist beschränkt, d. h. $\exists c > 0: \|Tx\|_Y \leq c\|x\|_X$ ($x \in X$).
- (ii) $T: X \rightarrow Y$ ist stetig.
- (iii) $T: X \rightarrow Y$ ist stetig an der Stelle $0 \in Y$.

2.6 Definition. Seien X, Y normierte Räume. Der Raum

$$L(X, Y) := \{T : X \rightarrow Y \mid T \text{ linear, beschränkt}\}$$

heißt der Raum der linearen beschränkten Operatoren von X nach Y . Wir setzen $L(X) := L(X, X)$. Der Raum $X' := L(X, \mathbb{K})$ heißt der (topologische) Dualraum von X . Oft schreibt man Tx statt $T(x)$.

Für $T \in L(X, Y)$ definiert man

$$\|T\| := \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{x \in X, \|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_Y.$$

$\|T\|$ heißt die Operatornorm von T . Sei

$$\begin{aligned} \ker T &:= N(T) := \{x \in X : Tx = 0\}, \\ \operatorname{Im} T &:= R(T) := T(X) := \{Tx : x \in X\} \end{aligned}$$

der Kern (englisch „null space“) bzw. der Wertebereich (englisch „range“) von T .

2.7 Bemerkung. Es gilt

$$\|Tx\|_Y \leq \|T\| \cdot \|x\|_X \quad (x \in X)$$

und

$$\|T\| = \inf\{C > 0 \mid \forall x \in X : \|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X\}.$$

2.8 Definition und Satz (Quotientenraum). Sei X normierter Raum, $M \subset X$ ein Unterraum. Sei $X/M := \{[x] = x + M : x \in X\}$ der Quotientenraum. Dann ist

$$\|[x]\| := \operatorname{dist}(x, M) := \inf_{y \in M} \|x - y\|$$

eine Seminorm auf X/M . Falls M abgeschlossen ist, ist $\|[\cdot]\|$ eine Norm. Falls X Banachraum ist und M abgeschlossen ist, so ist auch X/M Banachraum.

Beweis. Nur die letzte Aussage folgt nicht durch direktes Nachrechnen. Sei $([x_n])_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyfolge in X/M .

(i) Übergang zur Teilfolge: Da $\|([x_n]) - ([x_m])\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$, existiert eine Teilfolge $([x_{n_k}])_{k \in \mathbb{N}}$ von $([x_n])_{n \in \mathbb{N}}$, so dass $\|[x_{n_k}] - [x_{n_{k+1}}]\| < 2^{-(k+1)}$. Schreibe wieder $[x_k]$ statt $[x_{n_k}]$.

(ii) Wahl einer Cauchyfolge in X : Induktiv sieht man, dass nach Definition der Norm in X/M eine Folge $(z_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}} \subset X$ existiert mit $z_\ell \in [x_\ell]$ und

$$\|z_{\ell+1} - z_\ell\| \leq \|[x_{\ell+1}] - [x_\ell]\|_{X/M} + 2^{-\ell} \quad (\ell \in \mathbb{N}).$$

Damit

$$\begin{aligned} \|z_{k+m} - z_k\|_X &\leq \sum_{\ell=k+1}^{k+m} \|z_\ell - z_{\ell-1}\|_X \\ &\leq \sum_{\ell=k+1}^{k+m} \left(\| [x_\ell] - [x_{\ell-1}] \|_{X/M} + 2^{-\ell} \right) \\ &\leq \sum_{\ell=k+1}^{k+m} 2^{-\ell+1} \leq 2^{-k+1}, \end{aligned}$$

d.h. $(z_k)_k \subset X$ ist eine Cauchyfolge. Setze $z := \lim_k z_k$. Wegen

$$\| [x_k] - [z] \|_{X/M} = \| [z_k] - [z] \|_{X/M} \leq \| z_k - z \|_X \rightarrow 0$$

gilt $[x_k] \rightarrow [z]$ in X/M . □

2.9 Definition und Satz (direkte Summe). Seien $(X_1, \|\cdot\|_1)$, $(X_2, \|\cdot\|_2)$ normierte Räume. Dann wird durch

$$\|(x_1, x_2)\| = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2 \quad ((x_1, x_2) \in X_1 \times X_2)$$

eine Norm auf $X = X_1 \times X_2$ definiert. Mit dieser Norm heißt X die direkte Summe von X_1 und X_2 , Schreibweise $X = X_1 \oplus X_2$. Falls X_1 und X_2 beide Banachräume sind, so ist auch $X_1 \oplus X_2$ ein Banachraum.

Beweis. Nur die letzte Aussage folgt nicht durch Nachrechnen. Falls die Folge $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)})_n$ eine Cauchyfolge in $X_1 \oplus X_2$ ist, so sind auch die einzelnen Komponenten Cauchyfolgen und damit, falls X_1 und X_2 Banachräume sind, konvergent gegen x_1 bzw. x_2 . Damit ist aber auch die Folge $(x^{(n)})_n \subset X_1 \oplus X_2$ konvergent gegen $x := (x_1, x_2)$. □

2.10 Definition. Sei X \mathbb{K} -VR und \mathcal{T} eine Topologie auf X . Dann heißt (X, \mathcal{T}) ein topologischer Vektorraum, falls die Abbildungen

$$\begin{aligned} s : X \times X &\rightarrow X, (x_1, x_2) \mapsto x_1 + x_2 \\ m : \mathbb{K} \times X &\rightarrow X, (\alpha, x) \mapsto \alpha x \end{aligned}$$

beide stetig sind.

2.11 Bemerkung. a) Normierte Räume sind topologische Vektorräume.

b) Ein beliebiger metrischer Raum ist ein Hausdorffraum: Betrachte

$$U_x = B\left(x, \frac{d(x, y)}{3}\right), \quad U_y = B\left(y, \frac{d(x, y)}{3}\right).$$

2.12 Definition (\mathcal{L}^p -Räume). Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum.

a) Sei $1 \leq p < \infty$. Definiere $\mathcal{L}^p(\mu)$ als die Menge aller messbaren Funktionen $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$\|f\|_p := \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} < \infty.$$

b) Für $p = \infty$ wird $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ definiert als die Menge aller messbarer Funktionen $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, für welche es ein $C_f > 0$ gibt mit $\mu(\{x \in X : |f(x)| > C_f\}) = 0$. Man spricht von μ -fast überall beschränkten Funktionen. Für $f \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ definiert man

$$\|f\|_\infty := \inf \left\{ C \in \mathbb{R} : \mu(\{x \in X : |f(x)| > C\}) = 0 \right\}.$$

c) Für Funktionen $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ werden die entsprechenden Funktionenräume mit $\mathcal{L}^p(\mu; \mathbb{R})$ bezeichnet. Manchmal schreiben wir auch $\mathcal{L}^p(\mu; \mathbb{C})$ statt $\mathcal{L}^p(\mu)$.

Der folgende Satz aus der Analysis wird hier nicht bewiesen.

2.13 Satz. a) (Höldersche Ungleichung) Für $1 \leq p, q \leq \infty$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ gilt

$$\|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \quad (f \in \mathcal{L}^p(\mu), g \in \mathcal{L}^q(\mu)).$$

b) **(Minkowskische Ungleichung)** Für $1 \leq p \leq \infty$ gilt

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \quad (f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)).$$

c) Für $1 \leq p \leq \infty$ ist der Raum $\mathcal{L}^p(\mu)$ ein Vektorraum, und $\|\cdot\|_p$ definiert eine Seminorm (Halbnorm) auf $\mathcal{L}^p(\mu)$.

2.14 Definition und Satz (L^p -Räume). Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum, und sei $1 \leq p \leq \infty$. Definiere auf $\mathcal{L}^p(\mu)$ die Äquivalenzrelation \sim durch

$$f \sim g \quad :\iff \quad \mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0$$

(d.h. durch Gleichheit μ -fast überall). Die Menge der Äquivalenzklassen $\{[f] : f \in \mathcal{L}^p(\mu)\}$ wird mit $L^p(\mu)$ bezeichnet.

Auf $L^p(\mu)$ wird repräsentantenweise eine Vektorraumstruktur definiert: $\alpha[f] := [\alpha f]$ und $[f] + [g] := [f + g]$ für $\alpha \in \mathbb{C}$ und $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$. Analog definiert man

$$\|[f]\|_p := \|f\|_p \quad (f \in \mathcal{L}^p(\mu)).$$

Damit wird $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ zu einem Banachraum.

Falls das Maß durch das Lebesgue-Maß $\lambda|_\Omega$ auf einer messbaren Mengen $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ gegeben ist, schreibt man auch $L^p(\Omega)$ statt $L^p(\lambda|_\Omega)$.

2.15 Beispiele. Die folgenden Beispiele sind Spezialfälle der oberen Definition.

a) Der Raum \mathbb{R}^n oder \mathbb{C}^n wird mit jeder der Normen

$$\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p < \infty),$$

$$\|x\|_\infty := \max \{ |\xi_j|, j = 1, \dots, n \}$$

zu einem Banachraum.

b) Definiere für $1 \leq p < \infty$ die ℓ^p -Räume durch

$$\ell^p := \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \mid \xi_j \in \mathbb{C}, \|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^p \right)^{1/p} < \infty \right\},$$

und für $p = \infty$ den Raum ℓ^∞ durch

$$\ell^\infty := \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \mid \xi_j \in \mathbb{C}, \|x\|_\infty := \sup \{ |\xi_j|, j \in \mathbb{N} \} < \infty \right\}.$$

Dann ist ℓ^p für alle $1 \leq p \leq \infty$ ein Banachraum.

Das folgende Beispiel und die folgende Definition sind Nachträge zum Abschnitt Topologie.

2.16 Beispiel. Sei X ein \mathbb{K} -Vektorraum, und sei $L = \{p_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ eine Familie von Seminormen $p_\lambda : X \rightarrow [0, \infty)$. Definiere τ als das System aller Mengen $U \subset X$, für welche gilt

$$\forall x \in U \exists r \in \mathbb{N} \exists \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \Lambda \exists \varepsilon > 0 : B^{(\lambda_1)}(x, \varepsilon) \cap \dots \cap B^{(\lambda_r)}(x, \varepsilon) \subset U.$$

Dabei sei $B^{(\lambda_j)}(x, \varepsilon)$ die Kugel um x mit Radius ε bzgl. der Seminorm p_{λ_j} . Dann ist τ eine Topologie auf X , die sog. lokalkonvexe Topologie zu L auf X . Eine Subbasis von τ ist gegeben durch

$$\{B^{(\lambda)}(x, r) : \lambda \in \Lambda, x \in X, r > 0\}.$$

2.17 Definition. a) Sei X ein \mathbb{K} -Vektorraum und $X^* := \{f : X \rightarrow \mathbb{K}, f \text{ linear}\}$ der algebraische Dualraum von X . Für $Y \subset X^*$ bezeichnet man die Y -schwache Topologie $\mathcal{T}(Y)$ auf X auch mit $\sigma(X, Y)$.

b) Sei X normierter Vektorraum. Dann heißt $\sigma(X, X')$ die schwache Topologie auf X und $\sigma(X', X)$ die schwach-*-Topologie auf X' . (Wir werden später sehen, dass man X als Teilmenge von X'' auffassen kann.) Für die schwache Konvergenz schreibt man $x_n \rightharpoonup x$ oder $x_n \xrightarrow{w} x$, für die schwach-*-Konvergenz schreibt man $f_n \xrightarrow{w^*} f$ in X' .

b) Hilberträume

Im folgenden sei stets $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

2.18 Definition. a) Ein \mathbb{K} -Vektorraum X , versehen mit einer Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$, heißt ein Vektorraum mit Skalarprodukt oder ein Prähilbertraum, falls gilt:

- (i) Für alle $y \in X$ ist die Abbildung $x \mapsto \langle x, y \rangle$ linear.
- (ii) Für alle $x, y \in X$ gilt $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.
- (iii) Für alle $x \in X$ gilt $\langle x, x \rangle \geq 0$. Es gilt $\langle x, x \rangle = 0$ genau dann, wenn $x = 0$.

b) Zwei Vektoren $x, y \in X$ heißen orthogonal (in Zeichen $x \perp y$), falls $\langle x, y \rangle = 0$ gilt. Eine Familie $\{x_i\}_{i \in I}$ von Vektoren heißt orthonormal, falls gilt:

$$\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{falls } i = j, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

c) In einem Prähilbertraum $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ wird durch $\|x\| := \langle x, x \rangle^{1/2}$ die kanonische Norm definiert. Ein vollständiger Prähilbertraum heißt Hilbertraum.

2.19 Beispiele. a) Mit dem Skalarprodukt $\langle x, y \rangle := \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j}$ werden \mathbb{R}^n und \mathbb{C}^n zu einem Hilbertraum.

b) Der Raum $C([0, 1])$ wird mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx$$

zu einem Prähilbertraum.

c) Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum. Dann wird $L^2(\mu)$, versehen mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle := \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x) \quad (f, g \in L^2(\mu))$$

zu einem Hilbertraum. Insbesondere ist $L^2(\Omega)$ für $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein Hilbertraum.

Auch die folgenden elementaren Eigenschaften von Prähilberträumen werden als bekannt vorausgesetzt, sie können aber auch leicht direkt nachgerechnet werden.

2.20 Satz. Sei X Prähilbertraum.

a) (Satz von Pythagoras) Seien $x, y \in X$ orthogonal. Dann gilt

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

b) Sei $\{x_n\}_{n=1}^N$ orthonormal. Dann gilt

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, x_n \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{n=1}^N \langle x, x_n \rangle x_n \right\|^2.$$

c) (Besselsche Ungleichung). Sei $\{x_n\}_{n=1}^N$ orthonormal. Dann ist

$$\|x\|^2 \geq \sum_{n=1}^N |\langle x, x_n \rangle|^2 \quad (x \in X).$$

d) (Cauchy-Schwarz-Ungleichung). Es gilt

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (x, y \in X).$$

e) (Parallelogramm-Identität) Für $x, y \in X$ gilt

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

f) (Polarisationsformel) Für $x, y \in X$ gilt

$$\langle x, y \rangle = \begin{cases} \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2), & \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2), & \text{falls } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Die Bedeutung der Polarisationsformel liegt daran, dass Identitäten nur für die Norm nachgerechnet werden müssen und dann automatisch für die Skalarprodukte gelten.

Die Summe von zwei Hilberträumen X und Y ist wieder ein Hilbertraum, wenn man das Skalarprodukt auf $X \oplus Y$ durch

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle_{X \oplus Y} := \langle x_1, x_2 \rangle_X + \langle y_1, y_2 \rangle_Y$$

definiert. Man beachte, dass die zugehörige Norm gegeben ist durch

$$\|(x, y)\|_{X \oplus Y} = \left(\|x\|_X^2 + \|y\|_Y^2 \right)^{1/2}.$$

Diese Norm ist äquivalent zur Norm aus Satz 2.9.

c) Der Approximationssatz und der Satz von Riesz für Hilberträume

Im folgenden sei $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein \mathbb{K} -Hilbertraum.

2.21 Definition. a) $M \subset X$ heißt konvex, falls gilt

$$\forall x, y \in M \forall \alpha \in [0, 1] : \alpha x + (1 - \alpha)y \in M.$$

b) Zu $M \subset X$ heißt

$$M^\perp := \{x \in X \mid \forall y \in M : \langle x, y \rangle = 0\}$$

das orthogonale Komplement von M in X .

2.22 Bemerkung. a) M^\perp ist abgeschlossener linearer Teilraum von X . Es gilt $M \cap M^\perp = \{0\}$. Denn sei $x \in M \cap M^\perp$. Dann ist $\langle x, x \rangle = 0$, d.h. $x = 0$.

b) Es ist $M^\perp = \overline{M}^\perp = (\text{span}M)^\perp$.

2.23 Satz (Approximationssatz). Sei X ein Hilbertraum, $M \subset X$ konvex und abgeschlossen und $z_0 \in X$. Dann so existiert genau ein $x \in M$ mit $\|x - z_0\| = \text{dist}(z_0, M) := \inf\{\|y - z_0\| : y \in M\}$.

Beweis. Ohne Einschränkung sei $z_0 = 0$ (betrachte die verschobene Menge $M - z_0$). Sei $d := \inf\{\|y\| : y \in M\}$. Wähle eine Folge $(y_n)_n \subset M$ mit $\|y_n\| \rightarrow d$.

Falls $d = 0$, gilt $y_n \rightarrow 0$ und wegen $M = \overline{M}$ ist $0 \in M$.

Falls $d > 0$, schreiben wir unter Verwendung der Parallelogrammgleichung

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 &= 2\|y_n\|^2 + 2\|y_m\|^2 - 4 \cdot \underbrace{\left\| \frac{y_n + y_m}{2} \right\|^2}_{\in M} \\ &\leq 2\|y_n\|^2 + 2\|y_m\|^2 - 4d^2 \rightarrow 0, \end{aligned}$$

da $\|y_n\| \rightarrow d$. Daher ist $(y_n)_n$ Cauchy-Folge. Da M vollständig ist, existiert $x := \lim_n y_n \in M$. Es gilt $\|x\| = \lim_n \|y_n\| = d$. Damit folgt $\|x\| \leq \|y\|$ für alle $y \in M$.

Eindeutigkeit: Sei $\|x_1\| \leq \|y\|, \|x_2\| \leq \|y\|$ ($y \in M$). Dann ist

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_2\|^2 &= 2\|x_1\|^2 + 2\|x_2\|^2 - 4\left\| \frac{x_1 + x_2}{2} \right\|^2 \\ &= 2 \underbrace{\left(\|x_1\|^2 - \left\| \frac{x_1 + x_2}{2} \right\|^2 \right)}_{\leq 0} + 2 \underbrace{\left(\|x_2\|^2 - \left\| \frac{x_1 + x_2}{2} \right\|^2 \right)}_{\leq 0} \leq 0. \end{aligned}$$

□

2.24 Satz (Projektionssatz). Sei $M = \overline{M} \subset X$ linearer Teilraum. Dann existiert für alle $x \in X$ eine eindeutige Zerlegung $x = m + m'$ mit $m \in M, m' \in M^\perp$. Somit ist $E = M \oplus M^\perp$. Es ist $\|x - m\| = \min_{y \in M} \|x - y\|$.

Beweis. Wähle $m' \in x + M$ mit $\|m'\| \leq \|x + y\|$ ($y \in M$), und $m := x - m'$.

(i) Wir zeigen $m' \in M^\perp$. Es gilt $\|m' + ty\|^2 \leq \|m' + ty\|^2$ ($t \in \mathbb{K}, y \in M$). Andererseits ist

$$\|m' + ty\|^2 = \|m'\|^2 + 2 \operatorname{Re}\langle m', ty \rangle + |t|^2 \|y\|^2.$$

Für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt somit

$$|t|^2 \|y\|^2 + 2t \operatorname{Re}\langle m', y \rangle \geq 0,$$

also $\operatorname{Re}\langle m', y \rangle = 0$.

Im Falle $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ersetzt man t durch it und erhält

$$|t|^2 \|y\|^2 + 2t \operatorname{Im}\langle m', y \rangle \geq 0,$$

also $\operatorname{Im}\langle m', y \rangle = 0$.

(ii) Um die Eindeutigkeit zu zeigen, sei $x = m + m' = z + z'$ mit $m, z \in M, m', z' \in M^\perp$. Dann ist $m - z = z' - m' \in M \cap M^\perp = \{0\}$, d. h. $m = z, m' = z'$. \square

2.25 Satz (von Riesz). Sei X Hilbert-Raum und $T \in X'$. Dann existiert genau ein $x_T \in X$ mit

$$Tx = \langle x, x_T \rangle \quad (x \in X).$$

Es gilt $\|T\| = \|x_T\|_X$. Die Abbildung $X' \rightarrow X, T \mapsto x_T$ ist bijektiv, isometrisch und konjugiert linear.

Beweis. $M := \ker T = T^{-1}(\{0\})$ ist abgeschlossen als Urbild einer abgeschlossenen Menge unter der stetigen Abbildung T . Damit ist $X = M \oplus M^\perp$ nach Satz 2.24.

(i) Falls $M = X$, folgt $T = 0$. Wähle $x_T := 0$.

(ii) Sei $M \neq X$. Wähle $y \in M^\perp \setminus \{0\}$. Wegen $M \cap M^\perp = \{0\}$ ist dann $Ty \neq 0$. Setze $x_T := \frac{\overline{Ty}}{\|y\|^2} \cdot y$. Dann gilt $\|x_T\|^2 = \frac{|Ty|^2}{\|y\|^2}$ und

$$Tx_T = \frac{\overline{Ty}}{\|y\|^2} \cdot Ty = \|x_T\|^2.$$

Für $x \in M$ gilt $\langle x, x_T \rangle = 0 = Tx$ wegen $x_T \in M^\perp$.

Für $x \notin M$ gilt

$$T\left(x - \frac{Tx}{Tx_T} \cdot x_T\right) = Tx - \frac{Tx}{Tx_T} \cdot Tx_T = 0,$$

d.h. $\tilde{x} := x - \frac{Tx}{\|x_T\|} \cdot x_T \in M$.

Daher folgt $T\tilde{x} = \langle \tilde{x}, x_T \rangle (= 0)$. Wir erhalten

$$Tx = T\tilde{x} + \frac{Tx}{\|x_T\|} \cdot \underbrace{x_T}_{\|x_T\|^2} = \langle \tilde{x}, x_T \rangle + \left\langle \frac{Tx}{\|x_T\|} \cdot x_T, x_T \right\rangle = \langle x, x_T \rangle.$$

(iii) Nach Cauchy-Schwarz ist $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, x_T \rangle| \leq \|x_T\|$. Andererseits haben wir $\|T\| \geq |T(\frac{x_T}{\|x_T\|})| = \|x_T\|$.

(iv) Eindeutigkeit: Sei $Tx = \langle x, x_T \rangle = \langle x, \tilde{x}_T \rangle$ ($x \in X$). Dann gilt

$$0 = \langle x, x_T - \tilde{x}_T \rangle \quad (x \in X).$$

Wähle $x = x_T - \tilde{x}_T$ und erhalte $\|x_T - \tilde{x}_T\| = 0$.

(v) Die Abbildung ist konjugiert linear: Sei $T = \alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2$. Dann ist

$$\begin{aligned} Tx &= \alpha_1 T_1 x + \alpha_2 T_2 x = \alpha_1 \langle x, x_{T_1} \rangle + \alpha_2 \langle x, x_{T_2} \rangle = \\ &= \langle x, \bar{\alpha}_1 x_{T_1} \rangle + \langle x, \bar{\alpha}_2 x_{T_2} \rangle = \langle x, \bar{\alpha}_1 x_{T_1} + \bar{\alpha}_2 x_{T_2} \rangle = \langle x, x_T \rangle. \end{aligned}$$

(vi) Die Abbildung ist surjektiv: Zu $y \in X$ sei $T_y x := \langle x, y \rangle$. Dann ist $|T_y x| \leq \|y\| \cdot \|x\|$, d.h. T_y stetig und damit $T_y \in X'$. \square

d) Orthonormalbasen

2.26 Definition. (i) Sei M eine Menge. Eine Abbildung \prec auf einer Teilmenge von $M \times M$ heißt Halbordnung, falls gilt:

$$\begin{aligned} a &\prec a, \\ a &\prec b, b \prec a \Rightarrow a = b, \\ a &\prec b, b \prec c \Rightarrow a \prec c. \end{aligned}$$

Beachte, dass $a \prec b$ oder $b \prec a$ nicht für alle $a, b \in M$ gelten muss.

(ii) Eine Menge $Q \subset M$ heißt total geordnet oder eine Kette, falls für alle $a, b \in Q$ gilt: $a \prec b$ oder $b \prec a$.

(iii) Ein Element $a \in M$ heißt obere Schranke für $S \subset M$, falls $s \prec a$ für alle $s \in S$.

(iv) Ein Element $m \in M$ heißt maximal, falls aus $m \prec x$ folgt $m = x$.

2.27 Lemma (von Zorn). Sei M eine nichtleere Menge mit Halbordnung, für welche jede Kette eine obere Schranke in M besitzt. Dann besitzt M ein maximales Element.

Dieses Lemma ist eigentlich ein Axiom und äquivalent zum Wohlordnungssatz, welcher wiederum äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Die Formulierung dieser Axiome und der Beweis der Äquivalenz werden hier aber weggelassen.

2.28 Definition. Sei X ein Hilbertraum. Eine Teilmenge $S \subset X$ heißt Orthonormalbasis oder vollständiges orthonormales System, falls S eine maximale orthonormale Teilmenge von X ist (maximal bezüglich Mengeninklusion). Man spricht auch von Hilbertraumbasis.

2.29 Satz. Jeder nichttriviale Hilbertraum besitzt eine Orthonormalbasis.

Beweis. Sei \mathcal{S} die Menge aller orthonormalen Teilmengen von X . Dann ist $\mathcal{S} \neq \emptyset$ da $\{\frac{x}{\|x\|}\} \in \mathcal{S}$ für jedes $x \in X \setminus \{0\}$.

Sei $\{S_\alpha\}_{\alpha \in A}$ eine Kette in \mathcal{S} , d. h. für $\alpha, \beta \in A$ gilt $S_\alpha \subset S_\beta$ oder $S_\beta \subset S_\alpha$. Setze $S_0 := \bigcup_{\alpha \in A} S_\alpha \subset E$. Dann ist $S_0 \supset S_\alpha$ für alle $\alpha \in A$. Zu $x, y \in S_0$ existiert ein $\alpha \in A$ mit $x, y \in S_\alpha$, d. h. S_0 ist orthonormal. Damit ist S_0 eine obere Schranke zu $\{S_\alpha\}_{\alpha \in A}$. Nach dem Lemma von Zorn existieren maximale Elemente in \mathcal{S} . \square

2.30 Lemma. Seien X ein Prähilbertraum und $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ ein Orthonormalsystem. Dann gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}| < \infty \quad (x, y \in X).$$

Beweis. Für alle $N \in \mathbb{N}$ gilt nach der Cauchy-Schwarz-Ungleichung in \mathbb{R}^N und der Besselschen Ungleichung

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}| \leq \left(\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{n=1}^N |\langle y, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Mit $N \rightarrow \infty$ erhält man die Behauptung. \square

Im folgenden werden auch Hilberträume auftreten, welche eine überabzählbare Hilbertraumbasis besitzen, d.h. man muss grundsätzlich auch Summen mit überabzählbarer Indexmenge betrachten. Dazu dient die folgende Definition.

2.31 Definition. a) Sei $I \neq \emptyset$ eine Menge und $\alpha_i \geq 0$ ($i \in I$). Definiere

$$\sum_{i \in I} \alpha_i := \sup \left\{ \sum_{i \in I_0} \alpha_i : I_0 \subset I \text{ endlich} \right\} \in [0, \infty].$$

b) Sei X Hilbertraum, $I \neq \emptyset$ eine Menge und $y_i \in X$ für alle $i \in I, y \in X$. Dann heißt die Reihe $\sum_{i \in I} y_i$ unbedingt konvergent gegen ein Element $y \in X$, falls die Menge $I_0 := \{i \in I : y_i \neq 0\}$ abzählbar ist und für jede Aufzählung $I_0 = \{i_1, i_2, \dots\}$ die Gleichheit $\sum_{n=1}^{\infty} y_{i_n} = y$ gilt. Wir schreiben in diesem Fall

$$\sum_{i \in I} y_i = y.$$

2.32 Bemerkung. a) Für $X = \mathbb{K}^n$ ist eine Reihe mit abzählbarer Indexmenge genau dann unbedingt konvergent, falls sie absolut konvergent ist (vgl. großer Umordnungssatz).

b) Seien $I \neq \emptyset$ und $\alpha_i \in \mathbb{R}$ ($i \in I$) mit $\sum_{i \in I} |\alpha_i| < \infty$. Dann ist $I_0 := \{i \in I : \alpha_i \neq 0\}$ abzählbar, denn

$$\{i \in I : \alpha_i \neq 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{\{i \in I : |\alpha_i| > \frac{1}{n}\}}_{\text{endlich}}.$$

Da die Reihe absolut konvergent ist, ist $\sum_{i \in I} \alpha_i$ unbedingt konvergent nach dem großen Umordnungssatz.

2.33 Satz. Seien X ein Hilbertraum und $S \subset X$ ein Orthonormalsystem.

a) Für alle $x \in X$ konvergiert die Reihe $\sum_{e \in S} \langle x, e \rangle e$ unbedingt.

b) Sei $c_e \in \mathbb{C}$ für $e \in S$ mit $\sum_{e \in S} |c_e|^2 < \infty$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_{e \in S} c_e e$ unbedingt in X .

c) $x - \sum_{e \in S} \langle x, e \rangle e \in S^\perp$.

Beweis. a) Nach der Besselschen Ungleichung (Satz 2.20 c)) gilt für alle endlichen $\tilde{X} \subset X$

$$\sum_{e \in \tilde{X}} |\langle x, e \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Damit ist $\sum_{e \in X} |\langle x, e \rangle|^2 < \infty$, und nach Bemerkung 2.32 b) ist $X_0 := \{e \in S : \langle x, e \rangle \neq 0\}$ abzählbar. Sei $X_0 = \{e_1, e_2, \dots\}$.

Nach dem Satz von Pythagoras gilt

$$\left\| \sum_{n=N}^M \langle x, e_n \rangle e_n \right\|^2 = \sum_{n=N}^M |\langle x, e_n \rangle|^2 \rightarrow 0 \quad (N, M \rightarrow \infty).$$

Also ist $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ eine Cauchyreihe, und $y := \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n \in X$ existiert.

Analog existiert für jede Permutation $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ die umgeordnete Reihe $y_\sigma := \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_{\sigma(n)} \rangle e_{\sigma(n)}$. Wir zeigen $y = y_\sigma$. Für $z \in X$ gilt

$$\langle y, z \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \cdot \overline{\langle z, e_n \rangle} = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_{\sigma(n)} \rangle \overline{\langle z, e_{\sigma(n)} \rangle} = \langle y_\sigma, z \rangle.$$

Dabei wurde die absolute Konvergenz der Reihe nach Lemma 2.30 benutzt. Es folgt $y - y_\sigma \in X^\perp = \{0\}$.

b) wurde im Beweis von a) mitbewiesen.

c) Für $e \in X$ gilt mit der Bezeichnung aus a)

$$\left\langle x - \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n, e \right\rangle = 0.$$

(Betrachte die Fälle $e \in X_0$, d.h. $e = e_{n_0}$ und $e \notin X_0$, d.h. $\langle x, e \rangle = 0$.) □

2.34 Satz. *Seien X ein Hilbertraum und $S \subset X$ ein Orthonormalsystem. Dann sind äquivalent:*

- (i) S ist Orthonormalbasis.
- (ii) $S^\perp = \{0\}$.
- (iii) Für alle $y \in X$ gilt $y = \sum_{e \in S} \langle y, e \rangle e$.
- (iv) Für alle $x, y \in X$ gilt $\langle x, y \rangle = \sum_{e \in S} \langle x, e \rangle \overline{\langle y, e \rangle}$.
- (v) (Parsevalsche Gleichung) Es gilt

$$\|x\|^2 = \sum_{e \in S} |\langle x, e \rangle|^2 \quad (x \in X).$$

Beweis. (i) \Rightarrow (ii). Falls ein $x \in S^\perp \setminus \{0\}$ existiert, so ist $S \cup \left\{ \frac{x}{\|x\|} \right\}$ ein Orthonormalsystem.

(ii) \Rightarrow (iii). Satz 2.33 c).

(iii) \Rightarrow (iv). Die Reihen erstrecken sich nur über einen abzählbaren Indexbereich und konvergieren absolut nach Lemma 2.30 und Satz 2.33 a), man darf also einsetzen.

(iv) \Rightarrow (v). Setze $x = y$.

(v) \Rightarrow (i). Falls S nicht maximal ist, wähle $x \in S^\perp$ mit $\|x\| = 1$. Es folgt $\sum_{e \in S} |\langle x, e \rangle|^2 = 0$, Widerspruch zu (v). □

2.35 Definition. Ein metrischer Raum heißt separabel, wenn er eine abzählbare dichte Teilmenge besitzt.

2.36 Bemerkung. Ein normierter Raum X ist genau dann separabel, wenn es ein abzählbares linear unabhängiges $S \subset X$ gibt mit $\overline{\text{span } S} = X$. Insbesondere ist ein Hilbertraum genau dann separabel, wenn er eine höchstens abzählbare Orthonormalbasis besitzt.

Um das zu sehen, betrachtet man alle Linearkombinationen der Form $\sum_{i=1}^n a_i s_i$, $a_i \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$, $s_i \in S$.

2.37 Satz. Sei X ein unendlich-dimensionaler separabler Hilbertraum mit Hilbert-raumbasis $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$. Dann ist die Abbildung $X \rightarrow \ell^2$, $x \mapsto (\langle x, e_i \rangle)_{i \in \mathbb{N}}$ ein isometrischer Isomorphismus von Hilberträumen (d.h. linear, bijektiv und isometrisch).

Beweis. Die Linearität ist klar, Isometrie und damit Injektivität nach Satz 2.34 (v), die Surjektivität nach Satz 2.33 b). \square

2.38 Beispiele (Hilbertraumdimension). a) Der Raum $L^2(\Omega)$ mit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen ist ein separabler Hilbertraum. Speziell ist durch $e_n(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$ ($n \in \mathbb{Z}$) eine Hilbert-raumbasis des Hilbertraums $L^2((-\pi, \pi), \mathbb{C})$ gegeben (Fourierreihen).

b) Es gibt auch Prähilberträume mit überabzählbaren Orthonormalsystemen, wie das folgende Beispiel zeigt: Sei Y die Menge aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{(-T, T)} \in L^2(-T, T)$ für alle $T > 0$, für welche

$$\|f\|_1 := \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

existiert. Dann ist $\|\cdot\|_1$ eine Halbnorm auf Y , aber keine Norm (so gilt etwa für die charakteristische Funktion $f := \chi_{(-1,1)}$ zwar $\|f\|_1 = 0$, aber $f \neq 0$).

Sei $N := \{f \in Y : \|f\|_1 = 0\}$. Dann ist N ein abgeschlossener Unterraum. Sei $X := Y/N$ der Quotientenraum mit induzierter Norm $\|[f]\|_2 := \inf_{g \in N} \|f - g\|_1$ ($f \in Y$). Durch

$$\langle [f], [g] \rangle_2 := \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_1(x) g_1(x) dx \quad (f_1 \in [f], g_1 \in [g])$$

wird X zu einem Prähilbertraum, und es gilt $\langle [f], [f] \rangle_2 = \|[f]\|_2$.

Zu $\alpha > 0$ definiere $v_\alpha(x) := \sin(\alpha x)$ ($x \in \mathbb{R}$). Wegen

$$\frac{1}{T} \int_{-T}^T v_\alpha(x)^2 dx = \frac{1}{T} \left(T - \frac{\sin(2\alpha T)}{2\alpha} \right) \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 1$$

gilt $v_\alpha \in Y$ und $\|v_\alpha\|_1 = \|[v_\alpha]\|_2 = 1$. Andererseits erhält man für $\alpha \neq \beta$

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_{-T}^T \sin(\alpha r) \sin(\beta r) \, dr &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos((\alpha - \beta)r) - \cos((\alpha + \beta)r) \, dr \\ &= \frac{1}{2T} \left[\frac{\sin((\alpha - \beta)r)}{\alpha - \beta} - \frac{\sin((\alpha + \beta)r)}{\alpha + \beta} \right]_{r=-T}^{r=T} \\ &= \frac{1}{T} \frac{\sin((\alpha - \beta)T)}{\alpha - \beta} - \frac{\sin((\alpha + \beta)T)}{\alpha + \beta} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Daher gilt $\langle [v_\alpha], [v_\beta] \rangle_2 = 0$ für $\alpha \neq \beta$, d.h. $\{v_\alpha\}_\alpha$ ist ein überabzählbares Orthonormalsystem in X .

2.39 Beispiele (Separabilität). a) Der Raum $C([a, b])$ mit $\|\cdot\|_\infty$ -Norm ist ein separabler Banachraum, denn die Polynome mit rationalen Koeffizienten liegen dicht. Die Räume \mathbb{R}^n und ℓ^2 sind separabel nach Bemerkung 2.36. Ebenso separabel ist der Raum $L^2(\Omega)$ für eine offene Teilmenge $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

b) Ein Beispiel für einen nicht separablen metrischen Raum ist durch den Prähilbertraum aus Beispiel 2.38 b) gegeben. Auch der Banachraum ℓ^∞ ist ein Beispiel für einen nicht separablen Raum: Angenommen es existiert eine dichte Teilmenge $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \ell^\infty$. Schreibe $x_k = (\xi_{k1}, \xi_{k2}, \dots)$ und betrachte

$$\eta_k := \begin{cases} \xi_{kk} + 1, & \text{falls } |\xi_{kk}| < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt $|\eta_k| \leq 2$ und damit $y := (\eta_1, \eta_2, \dots) \in \ell^\infty$. Aber für alle $k \in \mathbb{N}$ haben wir $|\eta_k - \xi_{kk}| \geq 1$, d.h. es gilt $\|y - x_k\| \geq \|\eta_k - \xi_{kk}\| \geq 1$ ($k \in \mathbb{N}$), Widerspruch zur Dichtheit von $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

c) Auch der Raum $L^\infty(\Omega)$ für $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen ist ein Beispiel für einen nicht separablen Banachraum.

3. Lineare Operatoren: Grundbegriffe

a) Operatoren und Spektrum

Im folgenden sei stets $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

3.1 Beispiel (Shift-Operatoren). a) Definiere den Rechtsshift $S_R \in L(\ell^2)$ durch

$$S_R((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) := (y_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad y_n := \begin{cases} 0, & n = 1, \\ x_{n-1}, & n > 1. \end{cases}$$

Dann ist S stetig mit Norm 1 (sogar eine Isometrie, d.h. es gilt $\|Sx\|_2 = \|x\|_2$ ($x \in \ell^2$)), injektiv aber nicht surjektiv. Analog ist der Linkshift

$$S_L((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) := (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$$

stetig mit Norm 1, surjektiv aber nicht injektiv.

b) Sei $\ell^2(\mathbb{Z}; \mathbb{K}) := \{x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K} \mid \|x\|_2 := (\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x_n|^2)^{1/2} < \infty\}$ und S_R der Rechtsshift

$$S_R((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) := (x_{n-1})_{n \in \mathbb{Z}}.$$

Dann ist S_R ein Norm-Isomorphismus, d.h. S_R ist bijektiv, linear, S_R und S_R^{-1} sind stetig und S_R ist eine Isometrie.

3.2 Beispiel (Ableitungsoperator). a) Sei $X := C^1([0, 1])$ mit Norm $\|f\|_X := \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)| + |f'(t)|$ und $Y := C([0, 1])$ mit Norm $\|f\|_Y := \|f\|_\infty := \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|$. Dann sind X, Y Banachräume, und der Ableitungsoperator

$$T: X \rightarrow Y, \quad f \mapsto f'$$

ist linearer stetiger Operator mit Norm 1.

b) Wählt man in a) für X die Supremumsnorm $\|f\|_\infty$, so ist der Ableitungsoperator T nicht mehr stetig, denn für $f_n(t) := t^n$ gilt $\|f_n\|_\infty = 1$ und $\|Tf_n\|_\infty = n$, d.h. $\|T\| = \infty$. Jetzt ist X nur noch normierter Vektorraum, aber nicht mehr vollständig.

Das letzte Beispiel (Teil b)) ist typisch: Hier ist der Definitionsbereich $D(T)$ des Operators T ein linearer dichter Teilraum eines Banachraums X , und T bildet nach X ab. In diesem Sinn ist T ein Operator „in“ X .

3.3 Definition. Seien X, Y normierte Räume.

a) Ein linearer Operator $T: X \supset D(T) \rightarrow Y$ ist eine lineare Abbildung vom Definitionsbereich $D(T) \subset X$ nach Y , wobei $D(T)$ ein linearer Unterraum von X ist. Die Menge $G(T) := \{(x, Tx) : x \in D(T)\}$ heißt der Graph von T .

b) Der Operator T heißt abgeschlossen, wenn $G(T)$ eine abgeschlossene Teilmenge von $X \oplus Y$ ist.

c) Der Operator T heißt abschließbar, wenn es einen abgeschlossenen linearen Operator \overline{T} gibt mit $G(\overline{T}) = \overline{G(T)}$. Der Operator \overline{T} heißt Abschließung oder der Abschluss von T .

3.4 Bemerkung. a) Wie üblich bei Abbildungen, ist die Stetigkeit eines linearen Operators $T: X \supset D(T) \rightarrow Y$ unter Verwendung der Relativtopologie auf $D(T)$ erklärt. Damit ist T genau dann stetig, wenn für alle Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(T)$ mit $x_n \rightarrow 0$ gilt $Tx_n \rightarrow 0$.

b) Seien nun X, Y Banachräume. Ein linearer Operator T ist genau dann abgeschlossen, wenn für alle Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(T)$ mit $x_n \rightarrow x \in X$ und $Tx_n \rightarrow y \in Y$ gilt $x \in D(T)$ und $Tx = y$.

3.5 Lemma. Seien X, Y Banachräume und $T \in L(X, Y)$. Dann ist T abgeschlossen.

Beweis. Wir verwenden Bemerkung 3.4 b). Sei $(x_n)_n \subset D(T)$ mit $x_n \rightarrow x$ in X und $Tx_n \rightarrow y$ in Y . Dann gilt trivialerweise $x \in D(T) = X$, und da T stetig ist, folgt $Tx_n \rightarrow Tx$, d.h. $Tx = y$. \square

3.6 Lemma. Seien X, Y Banachräume und $T: X \supset D(T) \rightarrow Y$ ein linearer Operator. Dann definiert

$$\|x\|_T := \|x\|_X + \|Tx\|_Y \quad (x \in D(T))$$

eine Norm auf $D(T)$, die sogenannte Graphennorm. Der normierte Raum $(D(T), \|\cdot\|_T)$ ist genau dann ein Banachraum, wenn der Operator T abgeschlossen ist.

Beweis. (i) Sei T abgeschlossen und $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(T)$ eine Cauchyfolge bzgl. der Norm $\|\cdot\|_T$. Dann ist nach Definition der Norm $\|\cdot\|_T$ sowohl die Folge $(x_n)_n \subset X$ bzgl. der Norm $\|\cdot\|_X$ als auch die Folge $(Tx_n)_n \subset Y$ bzgl. der Norm $\|\cdot\|_Y$ eine Cauchyfolge. Da X und Y Banachräume sind, existieren $x \in X$ und $y \in Y$ mit $\|x_n - x\|_X \rightarrow 0$ und $\|Tx_n - y\|_Y \rightarrow 0$. Da T abgeschlossen ist, folgt nach Bemerkung 3.4 b) $x \in D(T)$ und $Tx = y$. Insbesondere folgt $\|x_n - x\|_T \rightarrow 0$. Also ist $(D(T), \|\cdot\|_T)$ ein Banachraum.

(ii) Die andere Richtung der Äquivalenz zeigt man analog. \square

Die folgenden Sätze werden im zweiten Teil der Vorlesung bewiesen.

3.7 Satz (Satz vom abgeschlossenen Graphen). Seien X, Y Banachräume, $T : X \rightarrow Y$ abgeschlossener linearer Operator. Falls $D(T)$ abgeschlossen ist, so ist T stetig.

3.8 Korollar. Seien X, Y Banachräume, $T : X \rightarrow Y$ linearer Operator. Falls $D(T)$ abgeschlossen ist, so ist T genau dann stetig, wenn T abgeschlossen ist.

3.9 Satz (Prinzip der offenen Abbildung). Seien X, Y Banachräume und $T \in L(X, Y)$ surjektiv. Dann ist T offen, d.h. das Bild einer offenen Menge ist offen.

3.10 Satz (Stetigkeit des Inversen). Seien X, Y Banachräume und $T : X \rightarrow Y$ ein abgeschlossener linearer Operator mit $\ker T = \{0\}$ und $R(T)$ abgeschlossen. Dann ist $T^{-1} : R(T) \rightarrow X$ stetig.

Im folgenden schreiben wir für einen Operator $T : X \rightarrow X$ statt $T - \lambda \text{id}_X$ einfach $T - \lambda$.

3.11 Definition. Sei X ein Banachraum und $T : X \rightarrow X$ ein linearer Operator mit $\overline{D(T)} = X$ (d.h. T ist dicht definiert).

a) $\rho(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid T - \lambda : D(T) \rightarrow X \text{ ist bijektiv}\}$ heißt die Resolventenmenge von T .

b) $\sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ heißt das Spektrum von T .

c) $\sigma_p(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda \text{ nicht injektiv}\}$ heißt das Punktspektrum von T (die Menge aller Eigenwerte von T).

d) $\sigma_c(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda \text{ injektiv, } \overline{R(T - \lambda)} = X, R(T - \lambda) \neq X\}$ heißt das kontinuierliche Spektrum von T .

e) $\sigma_r(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda \text{ injektiv, } \overline{R(T - \lambda)} \neq X\}$ heißt das residuelle Spektrum (oder Restspektrum) von T .

3.12 Bemerkung. a) Direkt aufgrund der Definition haben wir

$$\mathbb{C} = \rho(T) \dot{\cup} \sigma(T) = \rho(T) \dot{\cup} \sigma_p(T) \dot{\cup} \sigma_c(T) \dot{\cup} \sigma_r(T),$$

wobei $\dot{\cup}$ die disjunkte Vereinigung bezeichnet.

b) Falls $\dim X < \infty$, so ist $\sigma_c(T) = \sigma_r(T) = \emptyset$.

c) Sei T abgeschlossen und $\lambda \in \rho(T)$. Dann ist die Inverse $(T - \lambda)^{-1} : X \rightarrow D(T)$ stetig. Denn $T - \lambda$ ist ebenfalls abgeschlossen, der Wertebereich $R(T - \lambda) = X$ ist abgeschlossen. Damit folgt die Aussage aus dem Satz vom stetigen Inversen.

3.13 Definition. Sei $T : X \rightarrow X$ ein linearer Operator mit Definitionsbereich

$D(T)$.

a) Für $\lambda \in \rho(T)$ heißt $R_\lambda(T) := (T - \lambda)^{-1}$ die Resolvente von T .

b) Für $\lambda \in \sigma_p(T)$ heißt $\ker(T - \lambda)$ der geometrische Eigenraum von T zu λ und

$$N_\lambda^{(a)}(T) := \{x \in D(T) \mid \exists n \in \mathbb{N} : (T - \lambda)^n x = 0\}$$

der algebraische Eigenraum von T zu λ .

3.14 Beispiel. Sei $X = \ell^2$ und $S = S_R \in L(X)$ der Rechts-Shift aus Beispiel 3.1, d.h. $S(x_1, x_2, \dots) := (0, x_1, x_2, \dots)$. Dann ist $D(S) = \ell^2$, $\ker S = \{0\}$ und $\|e_1 - y\| \geq 1$ für alle $y \in R(S)$, wobei $e_1 := (1, 0, 0, \dots)$. Daher ist $\overline{R(S)} \neq X$ und damit $0 \in \sigma_r(S)$.

b) Eigenschaften der Resolventenabbildung

3.15 Lemma (Neumannsche Reihe). Sei X ein Banachraum und $T \in L(X)$ mit $\|T\| < 1$. Dann existiert $(1 - T)^{-1} \in L(X)$, und es gilt $(1 - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$ und $\|(1 - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}$.

Beweis. Es gilt

$$\sum_{n=0}^N \|T^n\| \leq \sum_{n=0}^N \|T\|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|T\|^n = \frac{1}{1 - \|T\|},$$

d.h. die Reihe konvergiert absolut. Damit existiert $S := \sum_{n=0}^{\infty} T^n \in L(X)$, und es gilt $\|S\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}$.

Es gilt $ST = TS = \sum_{n=0}^{\infty} T^{n+1} = S - 1$, d.h. $S(1 - T) = (1 - T)S = 1$ und damit $S = (1 - T)^{-1}$. \square

3.16 Satz. Sei X ein \mathbb{C} -Banachraum und T ein abgeschlossener linearer Operator in X mit $\overline{D(T)} = X$. Dann ist $\rho(T)$ offen und somit $\sigma(T)$ abgeschlossen.

Beweis. Falls $\rho(T) = \emptyset$, so ist nichts zu zeigen. Sei also $\lambda_0 \in \rho(T)$. Es gilt

$$T - \lambda = T - \lambda_0 - (\lambda - \lambda_0) = (T - \lambda_0)[1 - (\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0)^{-1}].$$

Für $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $|\lambda - \lambda_0| \cdot \|(T - \lambda_0)^{-1}\| < 1$ existiert

$$[1 - (\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0)^{-1}]^{-1} \in L(X)$$

nach Lemma 3.15. Damit existiert

$$(T - \lambda)^{-1} = [1 - (\lambda - \lambda_0)(T - \lambda_0)^{-1}]^{-1}(T - \lambda_0)^{-1} \in L(X).$$

Somit gilt

$$\left\{ \lambda \in \mathbb{C} : |\lambda - \lambda_0| < \|(T - \lambda_0)^{-1}\|^{-1} \right\} \subset \rho(T),$$

also ist $\rho(T)$ offen. □

3.17 Korollar. a) Für $\lambda_0 \in \rho(T)$ gilt

$$\|R_{\lambda_0}(T)\| \geq [\text{dist}(\lambda_0, \sigma(T))]^{-1}.$$

b) Für $\lambda_0 \in \rho(T)$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $|\lambda - \lambda_0| < \|R_{\lambda_0}(T)\|^{-1}$ gilt

$$R_\lambda(T) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R_{\lambda_0}(T)^{n+1}.$$

Beweis. a) folgt aus der letzten Zeile im Beweis von Satz 3.16, b) aus der Darstellung von $R_\lambda(T)$ im Beweis von Satz 3.16 und der Neumann-Reihe. □

3.18 Definition (holomorphe Funktionen in Banachräumen). Sei $\Omega \subset \mathbb{C}$ ein Gebiet, X ein \mathbb{C} -Banachraum und $x: \Omega \rightarrow X$. Dann heißt x holomorph [schwach holomorph] in $z_0 \in \Omega$, falls $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{x(z) - x(z_0)}{z - z_0}$ in der Norm von X [in der schwachen Topologie] existiert.

Der folgende Satz wird hier nicht bewiesen.

3.19 Satz. Sei X ein Banachraum, $z_0 \in \mathbb{C}$ und $\varepsilon > 0$. Es gelte

$$x(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

mit $a_n \in X$ und

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|a_n\| \cdot |z - z_0|^n < \infty \quad \text{für } |z - z_0| < \varepsilon.$$

Dann ist x holomorph an der Stelle z_0 .

3.20 Satz. Sei X ein Banachraum, T ein abgeschlossener linearer Operator in X mit $\overline{D(T)} = X$. Dann ist die Resolvente $\lambda \mapsto R_\lambda(T)$, $\rho(T) \rightarrow L(X)$, holomorph in $\rho(T)$.

Beweis. Sei $\lambda_0 \in \rho(T)$. Nach Korollar 3.17 b) lässt sich $R_\lambda(T)$ in eine absolut konvergente Potenzreihe

$$R_\lambda(T) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda - \lambda_0)^n R_{\lambda_0}(T)^{n+1}$$

entwickeln. Nach Korollar 3.19 ist $\lambda \mapsto R_\lambda(T)$ holomorph an der Stelle λ_0 . \square

Die beiden folgenden Aussagen sind Korollare zum Satz von Hahn-Banach und werden später bewiesen.

3.21 Lemma. *Sei X ein normierter Raum.*

a) *Zu $x \in X \setminus \{0\}$ existiert ein $f \in X'$ mit $f(x) = \|x\|_X$ und $\|f\|_{X'} = 1$.*

b) *Falls $x \in X$ mit $f(x) = 0$ ($f \in X'$), so ist $x = 0$.*

3.22 Satz. *Sei X ein \mathbb{C} -Banachraum und $T \in L(X)$. Dann ist das Spektrum $\sigma(T) \subset \mathbb{C}$ kompakt und nichtleer.*

Beweis. Für $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $|\lambda| > \|T\|$ ist $T - \lambda = (-\lambda)(1 - \lambda^{-1}T)$ nach Lemma 3.15 in $L(X)$ invertierbar, d.h. $\lambda \in \rho(T)$. Also ist $\sigma(T)$ eine abgeschlossene Teilmenge von $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|T\|\}$ und damit kompakt.

Für $|\lambda| > \|T\|$ gilt

$$\|R_\lambda(T)\| = \left\| \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n} \right\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} \rightarrow 0 \quad (|\lambda| \rightarrow \infty).$$

Angenommen, es wäre $\rho(T) = \mathbb{C}$. Dann ist $\|R_\lambda(T)\| \leq C$ ($\lambda \in \mathbb{C}$). Für $x \in X$ und $f \in X'$ ist die Abbildung $\lambda \mapsto f(R_\lambda(T)x)$ holomorph in ganz \mathbb{C} und beschränkt, also nach dem Satz von Liouville konstant. Wegen

$$|f(R_\lambda(T)x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \cdot \|R_\lambda(T)\| \rightarrow 0 \quad (|\lambda| \rightarrow \infty)$$

folgt $f(R_\lambda(T)x) = 0$ ($f \in X', x \in X, \lambda \in \mathbb{C}$). Nach Lemma 3.21 b) folgt daraus $R_\lambda(T)x = 0$ ($x \in X$), d.h. $R_\lambda(T) = 0$, Widerspruch. \square

3.23 Beispiel. Die folgenden Beispiele zeigen, dass für unbeschränkte Operatoren sehr wohl die Fälle $\sigma(T) = \mathbb{C}$ und $\sigma(T) = \emptyset$ auftreten können.

a) Sei $X = C([0, 1])$ und $Tf := f'$ für $f \in D(T) := C^1([0, 1])$. Dann ist T unbeschränkt, da $\|Tf_n\| = n$ und $\|f_n\| = 1$ gilt für $f_n(t) := t^n$.

Wir zeigen, dass T abgeschlossen ist: Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(T)$ mit $f_n \rightarrow f$ in X und $Tf_n = f'_n \rightarrow g$ in X . Da $(f_n)_n$ und $(f'_n)_n$ gleichmäßig konvergieren, gilt $f \in C^1([0, 1])$ und $f'_n \rightarrow f'$. Somit ist $f \in D(T)$ und $g = f' = Tf$.

Es gilt $\sigma(T) = \sigma_p(T) = \mathbb{C}$, denn die Funktion $f(t) := e^{\lambda t}$ liegt in $\ker(T - \lambda)$ für alle $\lambda \in \mathbb{C}$.

b) Sei $X := C_0([0, 1]) := \{f \in C([0, 1]) : f(0) = 0\}$ und $Tf := f'$ für $f \in D(T) := \{f \in X : f' \in X\}$. Sei $\lambda \in \mathbb{C}$, und seien $f, g \in X$. Betrachte die Gleichung $(T - \lambda)f = g$, d.h. $f' - \lambda f = g$. Versehen mit der Anfangsbedingung $f(0) = 0$ hat diese gewöhnliche Differentialgleichung die eindeutige Lösung

$$f(t) = e^{\lambda t} \int_0^t e^{-\lambda s} g(s) ds.$$

Es gilt $f'(0) = g(0) + \lambda f(0) = 0$, d.h. $f' \in X$ und damit $f \in D(T)$. Somit ist $T - \lambda : D(T) \rightarrow X$ bijektiv für alle $\lambda \in \mathbb{C}$, d.h. $\rho(T) = \mathbb{C}$.

Das letzte Beispiel zeigt, dass man bei unbeschränkten Operatoren sehr genau auf den Definitionsbereich achten muss. Für die Verknüpfung von Operatoren ergeben sich dabei natürliche Definitionsbereiche.

3.24 Definition. Seien X, Y, Z normierte Räume. Seien ferner S, \tilde{S} lineare Operatoren von X nach Y und T ein linearer Operator von Y nach Z .

a) Der Operator $S + \tilde{S}$ ist definiert durch

$$D(S + \tilde{S}) := D(S) \cap D(\tilde{S}) \text{ und } (S + \tilde{S})x := Sx + \tilde{S}x \quad (x \in D(S + \tilde{S})).$$

b) Der Operator $TS : X \rightarrow Z$ ist definiert durch

$$D(TS) := \{x \in D(S) : Sx \in D(T)\} \text{ und } (TS)x := T(Sx) \quad (x \in D(TS)).$$

c) Wir schreiben $S \subset \tilde{S}$, falls $D(S) \subset D(\tilde{S})$ und $\tilde{S}|_{D(S)} = S$ gilt.

4. Dualräume und adjungierte Operatoren

a) Dualräume und Reflexivität

4.1 Satz. Seien X normierter Raum und Y Banachraum. Dann ist $L(X, Y)$ Banachraum. Insbesondere ist X' Banachraum.

Beweis. Nur die Vollständigkeit ist nichttrivial. Sei $(A_n)_n$ Cauchyfolge in $L(X, Y)$. Dann ist $(A_n x)_n$ Cauchyfolge in Y für jedes $x \in X$.

Setze $Ax := \lim_n A_n x \in Y$. Dann ist A offensichtlich linear. Wegen

$$\|Ax\|_Y = \lim_n \|A_n x\|_Y \leq \lim_n \|A_n\| \cdot \|x\|_X \leq C \|x\|_X$$

ist $A \in L(X, Y)$. Da $\|(A - A_n)x\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|(A_m - A_n)x\|$, erhalten wir

$$\|A - A_n\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|(A - A_n)x\|}{\|x\|} = \sup_{x \neq 0} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\|(A_m - A_n)x\|}{\|x\|} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|A_m - A_n\| < \varepsilon$$

für $n \geq n_0$, d.h. es gilt $A_n \rightarrow A$ in $L(X, Y)$. □

4.2 Lemma. Sei X ein normierter Raum. Die Abbildung $X \rightarrow X''$, $x \mapsto \tilde{x}$ mit

$$\tilde{x}(\lambda) := \lambda(x) \quad (\lambda \in X')$$

ist linear und isometrisch.

Beweis. Es gilt

$$\widetilde{\alpha x + \beta y}(\lambda) = \lambda(\alpha x + \beta y) = \alpha \lambda(x) + \beta \lambda(y) = \alpha \tilde{x}(\lambda) + \beta \tilde{y}(\lambda),$$

d. h. die Abbildung $x \mapsto \tilde{x}$ ist linear. Weiter ist

$$\|\tilde{x}\|_{X''} = \sup_{\|\lambda\| \leq 1} |\tilde{x}(\lambda)| = \sup_{\|\lambda\| \leq 1} |\lambda(x)| \leq \sup_{\|\lambda\| \leq 1} \|\lambda\| \cdot \|x\|_X \leq \|x\|_X.$$

Nach Lemma 3.21 existiert zu jedem $x \in X$ ein $\lambda_0 \in X'$ mit $\|\lambda_0\| = 1$ und $\lambda_0(x) = \|x\|$. Damit gilt $\|\tilde{x}\| = \sup_{\|\lambda\| \leq 1} |\lambda(x)| \geq |\lambda_0(x)| = \|x\|$. □

4.3 Definition. Ein normierter Raum X heißt reflexiv, falls die kanonische Einbettung $X \hookrightarrow X''$ aus Lemma 4.2 surjektiv ist.

4.4 Beispiele. a) Jeder Hilbertraum ist reflexiv nach dem Satz von Riesz.

b) Sei $1 < p < \infty$ und (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum. Nach einem Satz von Riesz ist die Abbildung

$$T : L^q(\mu) \rightarrow (L^p(\mu))', (Tg)(f) := \int fgd\mu \quad (4-1)$$

ein isometrischer Isomorphismus von Banachräumen. Dabei ist $q \in (1, \infty)$ definiert durch $p^{-1} + q^{-1} = 1$.

Sei nun $\Lambda \in (L^p(\mu))''$. Definiere das Funktional $\Lambda_1 := \Lambda \circ T \in (L^q(\mu))'$. Nach dem Satz von Riesz, angewendet auf den Raum $(L^q(\mu))'$, existiert eine Funktion $h \in L^p(\mu)$, so dass für alle $g \in L^q(\mu)$ der Wert $\Lambda_1(g)$ gegeben ist durch

$$\Lambda_1(g) = \int ghd\mu. \quad (4-2)$$

Somit gilt für jedes $\lambda \in (L^p(\mu))'$

$$\Lambda(\lambda) = \Lambda_1(T^{-1}\lambda) = \int (T^{-1}\lambda) \cdot hd\mu = \lambda(h) = \tilde{h}(\lambda).$$

Dabei wurde für die zweite Gleichheit (4-2) verwendet und für die dritte Gleichheit (4-1). Wir haben gesehen, dass $\Lambda = \tilde{h}$ gilt, d.h. dass die Abbildung $h \mapsto \tilde{h}$, $X \rightarrow X''$, surjektiv ist. Die $L^p(\mu)$ -Räume sind für $1 < p < \infty$ also reflexiv.

c) In der Situation von b) gilt $(L^1(\mu))' = L^\infty(\mu)$ aber $L^1(\mu) \subsetneq (L^\infty(\mu))'$, d.h. $L^1(\mu)$ ist nicht reflexiv. Diese Aussage wird nicht bewiesen.

4.5 Definition (Konvergenz von Operatoren). Seien X, Y normierte Räume. Sei $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L(X, Y)$ und $T \in L(X, Y)$.

a) T_n konvergiert gleichmäßig oder in der Norm gegen T , wenn $\|T_n - T\|_{L(X, Y)} \rightarrow 0$.

b) T_n konvergiert stark (in der starken Operatortopologie) gegen T , wenn gilt

$$\forall x \in X : \|T_n x - Tx\|_Y \rightarrow 0.$$

Man schreibt $T_n \xrightarrow{s} T$.

c) T_n konvergiert schwach (in der schwachen Operatortopologie) gegen T , wenn gilt

$$\forall x \in X \forall f \in Y' : |f(T_n x) - f(Tx)| \rightarrow 0.$$

Man schreibt $T_n \xrightarrow{w} T$.

Man beachte, dass das Symbol $T_n \xrightarrow{w} T$ für Operatoren eine doppelte Bedeutung hat. Im Normalfall versteht man aber die Konvergenz nach Definition 4.5 darunter.

Eine Umgebungssubbasis der $0 \in L(X, Y)$ in der starken Operortopologie ist gegeben durch

$$\left\{ T \in L(X, Y) : \|Tx\|_Y < \frac{1}{n}, x \in X, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Analog ist eine Umgebungssubbasis der $0 \in L(X, Y)$ in der schwachen Operortopologie gegeben durch

$$\left\{ T \in L(X, Y) : |f(Tx)| < \frac{1}{n}, f \in Y', x \in X, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Offensichtlich gilt

$$T_n \xrightarrow{\|\cdot\|} T \implies T_n \xrightarrow{s} T \implies T_n \xrightarrow{w} T.$$

Die Umkehrungen gelten im allgemeinen nicht.

b) Adjungierte Operatoren in Banachräumen

4.6 Definition und Satz (Adjungierte beschränkter Operatoren). Seien X, Y Banachräume und $T \in L(X, Y)$. Dann wird durch $f_1(x) := f(Tx)$ für jedes $f \in Y'$ ein beschränktes lineares Funktional $f_1 \in X'$ definiert. Die Abbildung $T' : Y' \rightarrow X'$, $f \mapsto f_1$ heißt (Banachraum-)adjungierter Operator zu T . Es gilt $T' \in L(Y', X')$. Die Abbildung $T \mapsto T'$, $L(X, Y) \rightarrow L(Y', X')$ ist eine Isometrie.

Beweis. Wegen $f_1 = f \circ T$ ist die Linearität und die Stetigkeit von f_1 klar. Wegen

$$|f_1(x)| = |f(Tx)| \leq \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\|$$

ist $\|f_1\| \leq \|T\| \cdot \|f\|$, d.h. $\|T'\| \leq \|T\|$. Der Operator T' ist linear wegen

$$T'(\alpha f + \beta g) = (\alpha f + \beta g)(Tx) = \alpha f(Tx) + \beta g(Tx).$$

Ebenso ist die Abbildung $T \mapsto T'$ linear.

Zu zeigen ist noch, dass $\|T\| \leq \|T'\|$ gilt. Nach Lemma 3.21 a) existiert zu $x \in X$ ein $f_x \in X'$ mit $\|f_x\| = 1$ und $f_x(Tx) = \|Tx\|$. Damit ist

$$\|Tx\| = |f_x(Tx)| = |(T'f_x)(x)| \leq \|T'\| \cdot \|x\|. \quad \square$$

4.7 Bemerkung. a) Für $T \in L(X, Y)$ ist $T'' \in L(X'', Y'')$ und $T''|_X = T$. Denn es gilt $(T''\tilde{x})(f) = \tilde{x}(T'f) = (T'f)(x) = f(Tx) = \tilde{T}x(f)$.

b) Falls $T \in L(X, Y)$ und $S \in L(Y, G)$, so ist $(ST)' = T'S'$. Denn $((ST)'f)(x) = f(STx) = (S'f)(Tx) = [T'(S'f)](x)$.

c) Falls $T \in L(X, Y)$ invertierbar ist, so gilt $(T^{-1})' = (T')^{-1}$. Dies gilt wegen $(T^{-1})'T' = (TT^{-1})' = \text{id}' = \text{id}$ und $(T'(T^{-1})' = (T^{-1}T)' = \text{id}' = \text{id}$.

4.8 Definition (Adjungierte unbeschränkter Operatoren). Seien X, Y Banachräume und $T : X \rightarrow Y$ ein linearer dicht definierter Operator (d.h. $\overline{D(T)} = X$). Definiere

$$D(T') := \{f \in Y' : \exists f_1 \in X' \text{ mit } f(Tx) = f_1(x) \quad (x \in D(T))\}$$

und

$$T'f := f_1 \quad (f \in D(T')).$$

Kurz kann man auch schreiben: $D(T') = \{f \in Y' : x \mapsto f(Tx) \in X'\}$. Die Abbildung $T' : Y' \rightarrow X'$ mit Definitionsbereich $D(T')$ heißt (Banachraum-)Adjungierte von T .

4.9 Bemerkung. a) $T'f$ ist eindeutig definiert. Denn seien $f_1, f_2 \in X'$ mit $f_1(x) = f(Tx) = f_2(x) \quad (x \in D(T))$. Da $\overline{D(T)} = X$ und f_1, f_2 stetig sind, folgt $f_1 = f_2$ auf ganz X .

b) Es gilt $(f, g) \in G(T')$ genau dann, wenn $g(x) = f(Tx) \quad (x \in D(T))$.

c) Der Operator T' ist abgeschlossen. Denn sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(T')$ mit $f_n \rightarrow f$ in Y' und $T'f_n \rightarrow g$ in X' . Dann gilt für $x \in D(T)$:

$$f(Tx) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(Tx) = \lim_{n \rightarrow \infty} (T'f_n)(x) = g(x).$$

Damit gilt $f \in D(T')$ und $(f, g) \in G(T')$ nach b).

c) Adjungierte Operatoren in Hilberträumen

Hilberträume sind Spezialfälle von Banachräumen, daher übertragen sich die obigen Definitionen auch auf Hilberträume. Man verwendet aber meistens den Begriff der Hilbertraum-Adjungierten. Grundlage dafür ist die Beschreibung des Dualraums durch den Satz von Riesz (Satz 2.25).

4.10 Definition und Satz. Seien X, Y Hilberträume, und $T \in L(X, Y)$. Dann existiert zu jedem $y \in Y$ genau ein $y^* \in X$ mit

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, y^* \rangle \quad (x \in X).$$

Setze $T^*y := y^*$. Die Abbildung $T^* \in L(Y, X)$ heißt (Hilbertraum-)Adjungierte zu T .

Beweis. Das folgt sofort aus Satz 4.6 und dem Satz von Riesz. Man beachte, dass die Abbildung aus dem Satz von Riesz

$$i_X : X \rightarrow X', \quad x \mapsto \langle \cdot, x \rangle$$

isometrisch aber konjugiert linear ist. Damit hängen Hilbertraum- und Banachraumadjungierte über $T^* = i_X^{-1} \circ T' \circ i_Y$ zusammen. \square

4.11 Definition. Seien X, Y Hilberträume und $T : X \rightarrow Y$ ein linearer dicht definierter Operator. Definiere

$$D(T^*) := \{y \in Y : x \mapsto \langle Tx, y \rangle \text{ ist stetiges lineares Funktional auf } D(T)\}.$$

Für $y \in D(T^*)$ existiert ein eindeutiges $y^* \in X$ mit

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, y^* \rangle_X \quad (x \in D(T)).$$

Definiere $T^* : Y \rightarrow X$ durch $T^*y := y^*$ ($y \in D(T^*)$). Der Operator T^* heißt (Hilbertraum-)Adjungierte von T .

4.12 Definition. a) Seien X, Y Hilberträume und $T \in L(X, Y)$. Dann heißt T unitär, falls $TT^* = \text{id}_Y$ und $T^*T = \text{id}_X$ gilt.

b) Sei X ein Hilbertraum und T ein linearer dicht definierter Operator in X . Dann heißt T

- (i) selbstadjungiert, falls $T = T^*$,
- (ii) normal, falls $TT^* = T^*T$,
- (iii) wesentlich selbstadjungiert, falls T abschließbar ist und \bar{T} selbstadjungiert ist,
- (iv) symmetrisch, falls $T \subset T^*$ gilt.

Man beachte, dass zwei lineare Operatoren nur dann gleich sind, falls sie die gleichen Definitionsbereiche besitzen und darauf die gleichen Werte annehmen.

4.13 Lemma. Betrachte in der Situation von Definition 4.11 den unitären Isomorphismus

$$U : X \oplus Y \rightarrow Y \oplus X, (x, y) \mapsto (y, -x).$$

Dann gilt

$$G(T^*) = U(G(T)^\perp) = [U(G(T))]^\perp.$$

Beweis. Sei $(y, y^*) \in G(T^*)$. Nach Definition von T^* gilt

$$\langle Tx, y \rangle_Y = \langle x, y^* \rangle_X \quad (x \in D(T)),$$

d.h.

$$0 = -\langle x, y^* \rangle_X + \langle Tx, y \rangle_Y = \langle (x, Tx), (-y^*, y) \rangle_{X \oplus Y} = \langle (x, Tx), U^{-1}(y, y^*) \rangle_{X \oplus Y}.$$

Beachte dabei, dass $U^{-1}(y, x) = (-x, y)$ gilt. Somit ist $U^{-1}(y, y^*) \in G(T)^\perp$, d.h.

$$(y, y^*) \in U(G(T)^\perp) = [U(G(T))]^\perp.$$

Bei der letzten Gleichheit wurde verwendet, dass U unitär ist. □

4.14 Satz. Seien X, Y Hilberträume und $T : X \rightarrow Y$ ein dicht definierter linearer Operator. Dann ist T^* abgeschlossen. Falls T abschließbar ist, so ist T^* dicht definiert und $T^{**} = \overline{T}$.

Beweis. Wegen $G(T^*) = [U(G(T))]^\perp$ (siehe Lemma 4.13) ist T^* abgeschlossen.

Sei T abschließbar und $y_0 \in D(T^*)^\perp$. Dann ist

$$\langle y_0, y \rangle = 0 \quad (y \in D(T^*)).$$

Damit folgt

$$\langle (0, y_0), (-z, y) \rangle_{X \oplus Y} = 0 \quad ((y, z) \in G(T^*)).$$

Somit ist unter Verwendung von Lemma 4.13 und nach Definition des Abschlusses

$$(0, y_0) \in [U^{-1}(G(T^*))]^\perp = G(T)^{\perp\perp} = \overline{G(T)} = G(\overline{T}).$$

Daher ist $y_0 = \overline{T}0 = 0$, also $\overline{D(T^*)} = Y$. Wir wenden Lemma 4.13 nun an auf den adjungierten Operator $T^* : Y \rightarrow X$ und erhalten

$$G(\overline{T}) = [U^{-1}(G(T^*))]^\perp = [-U^{-1}(G(T^*))]^\perp = G(T^{**}).$$

Also gilt $T^{**} = \overline{T}$. □

4.15 Korollar. Seien X, Y Hilberträume und $T : X \rightarrow Y$ ein dicht definierter und abgeschlossener Operator. Dann ist T^* dicht definiert und abgeschlossen, und $T^{**} = \overline{T}$.

4.16 Satz. Seien X, Y Hilberträume und $T : X \rightarrow Y$ ein abgeschlossener und dicht definierter Operator. Dann gilt

- a) $R(T)^\perp = \overline{R(T)}^\perp = \ker T^*$.
- b) $\overline{R(T)} = (\ker T^*)^\perp$.
- c) $R(T^*)^\perp = \ker T$.
- d) $\overline{R(T^*)} = (\ker T)^\perp$.

Beweis. a) Es gilt $y \in R(T)^\perp$ genau dann, wenn für alle $x \in D(T)$ gilt $\langle Tx, y \rangle = 0$. Dies ist äquivalent zu $y \in D(T^*)$ und $T^*y = 0$, also zu $y \in \ker T^*$.

b) Nach a) gilt $\overline{R(T)} = (R(T))^{\perp\perp} = (\ker T^*)^\perp$.

c) Nach Satz 4.14 ist T^* abgeschlossen, dicht definiert, und es gilt $T^{**} = T$. Wende a) auf T^* an und erhalte $R(T^*)^\perp = \ker T^{**} = \ker T$.

d) Wende b) auf T^* an. □

4.17 Beispiel. Sei $X = L_2([0, 1])$. Definiere die Operatoren T_1, T_2, T_3 durch

$$\begin{aligned} D(T_1) &:= \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ absolutstetig, } f' \in L_2([0, 1])\}, \\ D(T_2) &= D(T_1) \cap \{f : f(0) = f(1)\}, \\ D(T_3) &= D(T_1) \cap \{f : f(0) = f(1) = 0\} \end{aligned}$$

und $T_k f := if'$ ($f \in D(T_k)$) für $k = 1, 2, 3$. Offensichtlich ist $D(T_k)$ dicht in X .

Sei $f \in D(T_1)$ und $g \in D(T_1)$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle T_1 f, g \rangle &= \int_0^1 if'(x)\overline{g(x)}dx \\ &= if(x)\overline{g(x)}\Big|_0^1 - \int_0^1 if(x)\overline{g'(x)}dx \\ &= if(1)g(1) - if(0)g(0) + \langle f, T_1 g \rangle. \end{aligned}$$

Damit gilt

$$\begin{aligned} \langle T_1 f, g \rangle &= \langle f, T_1 g \rangle \quad \text{für } f \in D(T_1), g \in D(T_3), \\ \langle T_1 f, g \rangle &= \langle f, T_1 g \rangle \quad \text{für } f, g \in D(T_2). \end{aligned}$$

Also haben wir $D(T_1) \subset D(T_3^*)$, $D(T_2) \subset D(T_2^*)$ und $D(T_3) \subset D(T_1^*)$.

Sei $g \in D(T_1^*)$ und $\varphi := T_1^* g$. Definiere $\Phi(x) := \int_0^x \varphi(t)dt$. Dann ist Φ absolutstetig mit $\Phi' = \varphi$. Für $f \in D(T_1)$ gilt

$$\begin{aligned} \int_0^1 if'(x)\overline{g(x)}dx &= \langle T_1 f, g \rangle = \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 f(x)\overline{\varphi(x)}dx \\ &= f(x)\Phi(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x)\overline{\Phi(x)}dx \\ &= f(1)\Phi(1) - \int_0^1 f'(x)\overline{\Phi(x)}dx. \end{aligned}$$

Wählt man für f eine konstante Funktion, so erhält man $\Phi(1) = 0$. Damit gilt

$$\int_0^1 if'(x)\overline{(g(x) + i\Phi(x))}dx = 0 \quad (f \in D(T_1)),$$

d.h. $g + i\Phi \in R(T_1)^\perp = \{0\}$. Also ist g absolutstetig und $g(0) = -i\Phi(0) = 0$, $g(1) = -i\Phi(1) = 0$, d.h. $g \in D(T_3)$.

Insgesamt haben wir $D(T_1^*) = D(T_3)$, $T_1^* g = T_3 g$ ($g \in D(T_3)$), also $T_1^* = T_3$. Genauso zeigt man $T_3^* = T_1$ und $T_2^* = T_2$. Insbesondere folgt, dass T_k abgeschlossen ist für $k = 1, 2, 3$.

5. Distributionen und Sobolevräume

In der Theorie der partiellen Differentialgleichungen ist es oftmals sinnvoll, den Begriff der bekannten klassischen Differenzierbarkeit aufzulockern. Dies ermöglicht es etwa, Lösungsbegriffe zu definieren, die zwar schwächer sind als bereits bekannte, trotzdem aber für gewisse Anwendungen ausreichend sind. Die Theorie der Distributionen stellt nun Begriffsbildungen zur Verfügung, die es uns im Folgenden erlauben werden gewisse Sachverhalte elegant zu beschreiben. Insbesondere werden wir in der Lage sein, der Diracschen δ -Funktion einen präzisen Sinn zu geben. Dies wiederum wird von großer Wichtigkeit für die darauf folgende Potentialtheorie sein. Zu erwähnen ist, dass der Name „Distributionen“ von L. Schwartz eingeführt wurde.

a) Distributionen

5.1 Definition. Sei $G \subset \mathbb{R}^n$ offen.

- a) Für eine Funktion $\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}$ heißt $\text{supp } \varphi := \overline{\{x \in G : \varphi(x) \neq 0\}}$ der Träger von φ .
- b) Die Menge $C_0^\infty(G) := \{\varphi \in C^\infty(G) : \text{supp } \varphi \subset G, \text{supp } \varphi \text{ kompakt}\}$ heißt die Menge der Testfunktionen auf G (oder die Menge der C^∞ -Funktionen mit kompaktem Träger). Manchmal sieht man auch die Bezeichnung $C_c^\infty(G) := C_0^\infty(G)$.
- c) Wir schreiben $K \subset\subset G$, falls K eine kompakte Teilmenge von G ist. Sei nun $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C_0^\infty(G)$, dann definieren wir die Konvergenz wie folgt:

$$\varphi_n \rightarrow_{\mathcal{D}} 0 \iff \begin{array}{l} (i) \quad \exists K \subset\subset G : \forall n \in \mathbb{N} : \text{supp } \varphi_n \subset K \\ (ii) \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}_0^n : \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_n(x)| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty \end{array}$$

Versieht man den Raum der Testfunktionen mit der zu dieser Konvergenz gehörenden Topologie, so schreibt man $\mathcal{D}(G)$.

In obiger Definition wurde die praktische Multiindex-Schreibweise verwendet.

5.2 Definition (Multiindex-Schreibweise). Seien $x, \xi \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$. Dann definieren wir

$$\begin{aligned} x^\xi &:= \sum_{j=1}^n x_j \xi_j, \\ |x| &:= \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2}, \\ x^\alpha &:= x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}, \end{aligned}$$

$$|\alpha| := \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

Für $f \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$ sei

$$\partial^\alpha f(x) := \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n} f(x).$$

5.3 Bemerkung. a) Eine Topologie, zu welcher obiger Konvergenzbegriff gehört, lässt sich als lokalkonvexe Topologie definieren. Die zugehörige Familie von Halbnormen ist jedoch relativ kompliziert zu definieren, was an Bedingung (i) in obiger Definition liegt.

b) Es existieren hinreichend viele Testfunktionen, ein Beispiel für eine Testfunktion wird in den Übungen konstruiert. Tatsächlich liegen die Testfunktionen sogar dicht in $L^p(G)$ für $1 \leq p < \infty$. Der Beweis dieser Aussage verwendet etwa den sogenannten Friedrichschen Glättungsoperator.

Da die Menge der Testfunktionen offensichtlich einen \mathbb{C} -Vektorraum bilden, ist die Menge der linearen Funktionale, d.h. der linearen Abbildungen $T: \mathcal{D}(G) \rightarrow \mathbb{C}$, betrachten. Eine stetige lineare Abbildung heißt eine Distribution auf G . Dabei entspricht die obige Topologie auf $\mathcal{D}(G)$ der Stetigkeit in folgender Definition.

5.4 Definition. $\mathcal{D}'(G)$ bezeichnet die Menge aller linearen Abbildungen von $\mathcal{D}(G)$ nach \mathbb{C} , welche stetig sind, d.h.

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{D}'(G) : \iff & \quad (i) \quad f : \mathcal{D}(G) \longrightarrow \mathbb{C} \text{ linear, und} \\ & \quad (ii) \quad \text{für } (\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{D}(G) \text{ mit } \varphi_n \rightarrow_{\mathcal{D}} 0 \text{ gilt} \\ & \quad \quad \quad f(\varphi_n) \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

$\mathcal{D}'(G)$ heißt Menge der Distributionen von G .

5.5 Beispiel (reguläre Distributionen). Sei $u \in L^1_{\text{loc}}(G) := \{u : G \rightarrow \mathbb{C} : \forall K \subset G, K \text{ kompakt: } u|_K \in L^1(K)\}$. Dann definiert

$$\begin{aligned} [u] : \mathcal{D}(G) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto [u](\varphi) := \int_G u(x)\varphi(x)dx \end{aligned}$$

eine Distribution, denn

(i) $[u]$ ist offensichtlich linear.

(ii) Sei $(\varphi_n)_n$ eine Folge in \mathcal{D} mit $\varphi_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, dann folgt:

$$|[u]\varphi_n| \leq \int_G |u\varphi_n| \leq \|u\|_{L^1(K)} \cdot \sup_{x \in K} |\varphi_n(x)| \rightarrow 0$$

für $n \rightarrow \infty$ und ein $K \subset\subset G$. In diesem Zusammenhang spricht man auch davon, dass $[u]$ eine von u erzeugte Distribution ist. Eine von einer L^1_{loc} -Funktion erzeugte Distribution heißt *reguläre* Distribution.

5.6 Beispiel (Dirac-Distribution). Ein Beispiel für eine nicht-reguläre Distribution ist die sog. Dirac-Distribution (Diracsche „Deltafunktion“). Sei $x_0 \in G$ fest.

$$\begin{aligned} \delta_{x_0} : \mathcal{D}(G) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \varphi &\longmapsto \delta_{x_0}(\varphi) := \varphi(x_0) \end{aligned}$$

(i) Linearität ist klar.

(ii) Sei $(\varphi_n)_n$ eine Folge in $\mathcal{D}(G)$ mit $\varphi_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, dann folgt:

$$|\delta_{x_0}\varphi_n| = |\varphi_n(x_0)| \leq \sup_{x \in K} |\varphi_n(x)| \rightarrow 0$$

für $n \rightarrow \infty$ und ein $K \subset\subset G$.

(iii) δ_{x_0} ist nicht regulär

Beweis: Sei angenommen, dass ein $u \in L^1_{\text{loc}}(G)$ existiert, so dass für alle $\varphi \in \mathcal{D}(G)$ gilt

$$\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0) = \int_G u(x)\varphi(x)dx$$

Es gibt nun sicher ein $\varepsilon > 0$ so dass $\overline{B(x_0, \varepsilon)} \subset G$ und $\int_{B(x_0, \varepsilon)} |u(x)|dx < 1$ gilt. Weiter finden wir eine Testfunktion φ für die einerseits $\text{supp } \varphi \subset B(x_0, \varepsilon)$ und andererseits $\forall x \in G : \varphi(x_0) \geq \varphi(x) \geq 0, \varphi(x_0) > 0$ gilt. Damit ergibt sich dann aber

$$\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0) = |\varphi(x_0)| = \left| \int_G u(x)\varphi(x)dx \right| \leq \varphi(x_0) \int_{B(x_0, \varepsilon)} |u(x)|dx < \varphi(x_0),$$

was im Widerspruch zur Annahme steht.

Wie zu Anfang dieses Kapitels bereits erwähnt wurde, haben wir das Ziel, den klassischen Ableitungsbegriff aufzulockern oder zu verallgemeinern. Das bedeutet aber, dass sich dieser Ableitungsbegriff bei klassisch differenzierbaren Funktionen nicht von dem klassischen Begriff unterscheiden sollte. Es sei $f \in C^k(\mathbb{R}^n)$ und $[f]$ die von f erzeugte reguläre Distribution. Offenbar gilt dann für alle $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ und alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ mit $|\alpha| \leq k$

$$[\partial^\alpha f](\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha f \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} f \partial^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} [f](\partial^\alpha \varphi)$$

Dies motiviert die folgende

5.7 Definition. Für beliebiges $f \in \mathcal{D}'(G)$ sei für $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$

$$\begin{aligned} \partial^\alpha f : \mathcal{D}(G) &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \varphi &\longmapsto (-1)^{|\alpha|} f(\partial^\alpha \varphi) \end{aligned}$$

$\partial^\alpha f$ heißt Ableitung der Distribution f vom Grad $|\alpha|$.

Es ist klar, dass $\partial^\alpha f \in \mathcal{D}'(G)$ ist, da mit $\varphi_n \rightarrow 0$ auch $\partial^\alpha \varphi_n \rightarrow 0$ gilt. Also ist jede Distribution beliebig oft differenzierbar.

5.8 Beispiele. Sei $x_0 \in G \subset \mathbb{R}$ und

$$h_{x_0}(x) := \begin{cases} 1, & x \geq x_0 \\ 0, & x < x_0 \end{cases}$$

für $x \in G$, dann gilt $[h_{x_0}]' = \delta_{x_0}$.

Ist $\varphi \in C_c^\infty(G)$, so folgt, wenn wir o.B.d.A. $G = (a, b)$ annehmen:

$$[h_{x_0}]'(\varphi) = - \int_a^b h_{x_0}(x) \varphi'(x) dx = - \int_{x_0}^b \varphi'(x) dx = \varphi(x_0) = \delta_{x_0}(\varphi).$$

b) Sobolevräume: Definition und erste Eigenschaften

Im folgenden sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet und $1 \leq p < \infty$.

Für eine Distribution $u \in \mathcal{D}'(G)$ und einen Multiindex $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ schreiben wir

$$\partial^\alpha u \in L^p(G),$$

falls eine Funktion $f \in L^p(G)$ existiert mit $\partial^\alpha u = [f]$ in $\mathcal{D}'(G)$. Hier ist $[f]$ wieder die zu f gehörige reguläre Distribution.

5.9 Definition (Sobolevräume). a) Zu $s \in \mathbb{N}_0$ definiere

$$W^{s,p}(G) := \{u \in \mathcal{D}'(G) : \partial^\alpha u \in L^p(G) \quad (0 \leq |\alpha| \leq s)\}.$$

Als Norm in $W^{s,p}(G)$ definiert man

$$\|u\|_{W^{s,p}(G)} := \|u\|_{s,p,G} := \left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq s} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(G)}^p \right)^{1/p}.$$

b) Zu $s \in \mathbb{N}_0$ definiere $H^{s,p}(G)$ als die Vervollständigung von $\{u \in C^s(G) : \|u\|_{s,p,G} < \infty\}$. Im Falle $p = 2$ schreiben wir auch $H^s(G)$ statt $H^{s,2}(G)$.

c) Zu $s \in \mathbb{N}_0$ definiere $H_0^{s,p}(G)$ als den Abschluss von $C_0^\infty(G)$ im Raum $H^{s,p}(G)$.

5.10 Bemerkung. a) In der Definition von $W^{s,p}(G)$ wird insbesondere $u \in L^p(G)$ gefordert. Daher kann man auch schreiben

$$W^{s,p}(G) = \{u \in L^p(G) : \partial^\alpha u \in L^p(G) \quad (0 \leq |\alpha| \leq s)\}.$$

b) Die Vervollständigung eines metrischen Raums kann abstrakt definiert werden. Im Fall von $H^{s,p}(G)$ ist aber wegen $\|\cdot\|_{L^p(G)} \leq \|\cdot\|_{s,p,G}$ offensichtlich $H^{s,p}(G) \subset L^p(G)$, d.h. ein Element der Vervollständigung kann mit einer Funktion in $L^p(G)$ identifiziert werden.

c) Im Fall $p = 2$ erhält man das Skalarprodukt

$$\langle u, v \rangle_{W^{s,2}(G)} := \sum_{|\alpha| \leq s} \langle \partial^\alpha u, \partial^\alpha v \rangle_{L^2(G)}.$$

5.11 Lemma. Die Räume $H^{s,p}(G)$ und $W^{s,p}(G)$ sind Banachräume.

Beweis. Der Raum $H^{s,p}(G)$ ist als Vervollständigung eines normierten Raumes ein Banachraum. Sei also $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset W^{s,p}(G)$ eine Cauchyfolge. Nach Definition der Norm ist für $0 \leq |\alpha| \leq s$ auch $(\partial^\alpha u_n)_n \subset L^p(G)$ eine Cauchyfolge, daher existiert ein $u_\alpha \in L^p(G)$ mit $\partial^\alpha u_n \rightarrow u_\alpha$ in $L^p(G)$. Setze $u := u_{(0,\dots,0)}$.

Für die zugehörigen regulären Distributionen gilt mit der Hölder-Ungleichung für alle $\varphi \in \mathcal{D}(G)$

$$\begin{aligned} |[\partial^\alpha u_n](\varphi) - [u_\alpha](\varphi)| &= \left| \int_G (\partial^\alpha u_n - u_\alpha)(x) \varphi(x) dx \right| \\ &\leq \|\partial^\alpha u_n - u_\alpha\|_{L^p(G)} \|\varphi\|_{L^q(G)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

wobei $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ist. Also gilt

$$\begin{aligned} (\partial^\alpha [u])(\varphi) &= (-1)^{|\alpha|} [u](\partial^\alpha \varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} [u_n](\partial^\alpha \varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\partial^\alpha u_n](\varphi) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\partial^\alpha u_n](\varphi) = [u_\alpha](\varphi) \end{aligned}$$

für alle $\varphi \in \mathcal{D}(G)$. Somit ist $\partial^\alpha u = u_\alpha$ in $\mathcal{D}'(G)$, d.h. $u \in W^{s,p}(G)$.

Es folgt

$$\|u_n - u\|_{s,p,G}^p \leq \sum_{0 \leq |\alpha| \leq s} \|\partial^\alpha u_n - \partial^\alpha u\|_{L^p(G)}^p \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

also haben wir $u_n \rightarrow u$ in $W^{s,p}(G)$, und $W^{s,p}(G)$ ist ein Banachraum. \square

5.12 Lemma. Für $1 \leq p < \infty$ und $s \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$H^{s,p}(G) \subset W^{s,p}(G).$$

Beweis. Sei $u \in H^{s,p}(G)$ und $(u_n)_n \subset C^s(G)$ eine Cauchyfolge bzgl. $\|\cdot\|_{s,p,G}$, welche gegen u konvergiert. Nach Definition der $\|\cdot\|_{s,p,G}$ -Norm gilt wieder $\partial^\alpha u_n \rightarrow u_\alpha$ mit $u_\alpha \in L^p(G)$. Wie im letzten Beweis sieht man $\partial^\alpha u = u_\alpha$ in $\mathcal{D}'(G)$ und damit $u \in W^{s,p}(G)$. \square

Tatsächlich sind die beiden Definitionen von Sobolevräumen für allgemeine Gebiete äquivalent. Der folgende Satz wurde erst 1964 bewiesen (während die ersten Definitionen bereits 1938 formuliert wurden).

5.13 Satz. Für $1 \leq p < \infty$ und $s \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$W^{s,p}(G) = H^{s,p}(G).$$

Beweisskizze. Wir müssen nur noch $W^{s,p}(G) \subset H^{s,p}(G)$ zeigen, d.h. zu zeigen ist, dass $C^m(G) \cap H^{s,p}(G)$ dicht in $W^{s,p}(G)$ liegt. Unter Verwendung des Friedrichschen Glättungsoperators kann man sogar zeigen, dass

$$\{\varphi \in C^\infty(G) : \|\varphi\|_{s,p,G} < \infty\}$$

dicht in $W^{s,p}(G)$ liegt. Dies geschieht über eine kompakte Ausschöpfung von G und eine zugehörige Partition der Eins. Die Details sind z.B. im Buch von Adams [1] beschrieben. \square

Die Räume $H^{s,p}(G)$ und $W^{s,p}(G)$ sind typische Sobolevräume, benannt nach Sergei L'vovich Sobolev (6.10.1908 - 3.1.1980). Wir gehen jetzt noch kurz auf den Raum $H_0^{s,p}(G)$ ein, wobei wir uns auf $p = 2$ beschränken. Im folgenden bezeichne

$$\langle u, v \rangle_2 := \int_G u(x) \overline{v(x)} dx$$

das L^2 -Skalarprodukt. Für vektorwertige Abbildungen $F, G \in L^2(G)^n := L^2(G; \mathbb{C}^n)$ wird ebenfalls die Bezeichnung $\langle F, G \rangle_2 := \int_G \sum_{i=1}^n F_i(x) \overline{G_i(x)} dx$ verwendet. Für $F \in C^1(G)^n$ war $\operatorname{div} F = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} F_i$ die Divergenz.

Analog zur Definition von $W^{s,p}(G)$ betrachtet man

$$W_0^{1,2}(G) := \{u \in H^{1,2}(G) : \forall F \in (L^2(G))^n, \operatorname{div} F \in L^2(G) : \langle u, \operatorname{div} F \rangle_2 = -\langle \nabla u, F \rangle_2\}.$$

Der Raum $W_0^{1,2}(G)$ verallgemeinert die Bedingung $u|_{\partial G} = 0$. Ist nämlich ∂G glatt und u ebenfalls glatt, so können wir zunächst

$$0 = \int_G u \overline{\operatorname{div} F} dx + \int_G \nabla u \overline{F} dx = \int_{\partial G} u \langle n, \overline{F} dS(x) \rangle \quad (F \in C^1(\overline{G}))$$

und somit $u|_{\partial G} = 0$ schließen.

5.14 Satz. *Es gilt $H_0^{1,2}(G) = W_0^{1,2}(G)$.*

Beweis. (i) Zu $u \in H_0^{1,2}(G)$ existiert nach Definition eine Folge $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(G)$ mit $u_n \rightarrow u$ bezüglich der $H^{1,2}$ -Norm. Es ergibt sich für alle $F \in (L^2(G))^n$ mit $\operatorname{div} F \in L^2(G)$:

$$\langle u, \operatorname{div} F \rangle_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle u_n, \operatorname{div} F \rangle_2 = - \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \nabla u_n, F \rangle_2 = - \langle \nabla u, F \rangle_2,$$

d.h. es gilt $u \in W_0^{1,2}(G)$. Hier wurde die Hölder-Ungleichung für $p = 2$ in der Form

$$|\langle (u - u_n), \operatorname{div} F \rangle_2| \leq \|u - u_n\|_2 \cdot \|\operatorname{div} F\|_2$$

verwendet.

(ii) Zunächst ist offensichtlich, dass $W_0^{1,2}(G)$ ein Hilbertraum mit dem $H^{1,2}$ -Skalarprodukt ist. Weiter ist nun $H_0^{1,2}(G)$ ein abgeschlossener Unterraum. Wir werden zeigen, dass das orthogonale Komplement

$$(H_0^{1,2}(G))^\perp := \{u \in W_0^{1,2}(G) : \langle u, \varphi \rangle_{W^{1,2}(G)} = 0 \quad (\varphi \in H_0^{1,2}(G))\}$$

nur aus der Null besteht. Da der Raum $W_0^{1,2}(G)$ in der Form $W_0^{1,2}(G) = H_0^{1,2}(G) \oplus (H_0^{1,2}(G))^\perp$ direkt zerlegt werden kann, folgt daraus die Behauptung.

Sei also $u \in (H_0^{1,2}(G))^\perp$. Offenbar gilt dann für alle $\varphi \in \mathcal{D}(G)$

$$\langle u, \varphi \rangle_{W^{1,2}(G)} = \langle u, \varphi \rangle_2 + \langle \nabla u, \nabla \varphi \rangle_2 = 0.$$

Damit gilt

$$(\Delta[u])(\varphi) = \operatorname{div}[\nabla u](\varphi) = - \langle \nabla u, \nabla \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle = [u](\varphi) \quad (\varphi \in \mathcal{D}(G)),$$

d.h. $\Delta u = u \in L^2(G)$. Daraus folgt nun wiederum

$$0 \leq \|u\|_2^2 = \langle u, u \rangle_2 = \langle u, \Delta u \rangle_2 = - \langle \nabla u, \nabla u \rangle_2 = - \|\nabla u\|_2^2 \leq 0$$

also $u = 0$ und das war zu zeigen. □

c) Wichtige Sätze aus der Theorie der Sobolevräume

Die folgenden Ergebnisse aus der Theorie der Sobolevräume werden nicht bewiesen.

5.15 Satz (Sobolevscher Einbettungssatz). *Seien $s \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}_0$ und $1 \leq p < \infty$, und sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein C^1 -Gebiet.*

Falls $s > \frac{n}{p} + k$, dann gilt

$$W^{s,p}(G) \hookrightarrow C_b^k(G).$$

Weiter existiert ein $C > 0$ so dass für alle $u \in W^{s,p}(G)$ die Abschätzung

$$\|u\|_{C_b^k(G)} \leq C \|u\|_{W^{s,p}(G)}$$

gilt.

5.16 Definition. Seien X und Y normierte Räume und $K : X \rightarrow Y$ eine Abbildung. Man spricht davon, dass K kompakt ist, falls für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X , welche dort beschränkt ist gilt: $(Kx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ besitzt in Y eine konvergente Teilfolge.

5.17 Definition. Sei $G \subset \mathbb{R}^d$.

- (i) Für eine beliebige Indexmenge I sei $(U_i)_{i \in I}$ eine Überdeckung von G . Sie heißt lokal-endlich, falls gilt:

$$\forall x \in G : \exists \varepsilon > 0 : \#\{U_i : U_i \cap B(x, \varepsilon) \neq \emptyset, i \in I\} < \infty$$

- (ii) G besitzt die Segmenteigenschaft genau dann wenn es eine lokal endliche offene Überdeckung $\{U_i, i \in I\}$ des Randes ∂G mit

$$\forall i \in I : \exists \xi_i \in \mathbb{R}^d : \forall \alpha \in U_i \cap \overline{G} \forall t \in (0, 1) : x + t\xi_i \in G$$

gibt.

5.18 Satz (Rellich-Kondrachov). a) Sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet. Sei $1 \leq p < \infty$ und $m \in \mathbb{N}$. Dann ist die Einbettung

$$W_0^{m,p}(G) \hookrightarrow L^p(G)$$

kompakt.

b) Sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet, welches die Segmenteigenschaft besitzt. Für $1 \leq p < \infty$ und $m \in \mathbb{N}$ ist die Einbettung

$$W^{m,p}(G) \hookrightarrow L^p(G)$$

kompakt.

c) Sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet, welches die Segmenteigenschaft besitzt. Für $1 \leq p < \infty$ und $m \in \mathbb{N}$ mit $mp > n$ ist die Einbettung

$$W^{m,p}(G) \hookrightarrow C_b(\overline{G})$$

kompakt.

Die folgende Ungleichung ist sehr wichtig, um Abschätzungen beweisen zu können.

5.19 Satz (Erste Poincarésche Ungleichung). *Es sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, welches in eine Richtung beschränkt ist. Dann existiert eine Konstante $d > 0$ so, dass*

$$\|u\|_{L^2(G)} \leq d \|\nabla u\|_{L^2(G)^n} \quad (u \in H_0^1(G)).$$

Damit ist durch

$$|u|_{H^1(G)} := \left(\sum_{|\alpha|=1} \|\partial^\alpha u\|_{L^2(G)}^2 \right)^{1/2}$$

auf $H_0^1(G)$ eine Norm gegeben, welche zur Norm $\|\cdot\|_{H^1(G)}$ äquivalent ist.

Beweis. Es sei G ohne Einschränkung in x_n -Richtung beschränkt, d.h. es gelte

$$G \subset \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_n \leq d\}$$

für ein $d > 0$. Wir beweisen die Aussage zunächst für $u \in \mathcal{D}(G)$. Offenbar gilt nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung:

$$u(x) = \int_0^{x_n} \partial_n u(x_1, \dots, x_{n-1}, t) dt$$

Damit können wir unter Verwendung der Hölderschen Ungleichung wie folgt abschätzen:

$$\begin{aligned} |u(x)|^2 &\leq d \int_0^{x_n} |\partial_n u(x_1, \dots, x_{n-1}, t)|^2 dt \\ &\leq d \int_0^d |\nabla u(x_1, \dots, x_{n-1}, t)|^2 dt \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\|u\|_{L^2}^2 \leq d \int_0^{x_n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^d |\nabla u(x_1, \dots, x_{n-1}, t)|^2 dt dx_1 \cdots dx_{n-1} \right\} dx_n \leq d^2 \|\nabla u\|^2$$

und das war zu zeigen. Da $\mathcal{D}(G) \subset H_0^1(G)$ dicht liegt, folgt die Abschätzung für beliebige $u \in H_0^1(G)$ durch Approximation in der $\|\cdot\|_{H^1(G)}$ -Norm. \square

5.20 Satz (Zweite Poincarésche Ungleichung). *Sei $G \subset \mathbb{R}^n$ ein beschränktes Gebiet mit Segmenteigenschaft. Dann existiert ein $c > 0$ mit*

$$\|u\|_{L^2(G)} \leq c \left(\|\nabla u\|_{L^2(G)^n} + \left| \int_G u(x) dx \right| \right) \quad (u \in H^1(G)).$$

Damit ist durch

$$\|u\|_{H_*^1(G)} := \left(\|\nabla u\|_{L^2(G)^n}^2 + |\langle u, 1 \rangle_{L^2(G)}|^2 \right)^{1/2}$$

eine Norm auf $H^1(G)$ gegeben, welche zur Norm $\|\cdot\|_{H^1(G)}$ äquivalent ist.

Beweis. Wir nehmen an, dass eine Folge $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset H^1(G)$ existiert mit $\|u_n\|_{L^2(G)} = 1$ und

$$\|\nabla u_n\|_{L^2} + |\langle u_n, 1 \rangle_{L^2(G)}| < \frac{1}{n} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Nach dem Satz von Rellich-Kondrachov existiert eine Teilfolge $(\tilde{u}_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die etwa gegen $u_0 \in L^2(G)$ konvergiert. Wegen $\|\nabla \tilde{u}_n\|_{L^2} \rightarrow 0$ folgt, dass $(\tilde{u}_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset H^1(G)$ eine Cauchyfolge ist. Da $H^1(G)$ vollständig ist, existiert ein $\bar{u}_0 \in H^1(G)$ mit $\|\tilde{u}_n - \bar{u}_0\|_{H^1(G)} \rightarrow 0$. Wegen der Eindeutigkeit des Grenzwertes ist $u_0 = \bar{u}_0$. Wegen $\langle \tilde{u}_n, 1 \rangle \rightarrow 0$ folgt $\langle u_0, 1 \rangle = 0$. Andererseits gilt $\nabla u_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \nabla \tilde{u}_n = 0$, also $u_0 = \text{const.}$ Insgesamt folgt also $u_0 = 0$ was im Widerspruch zu

$$\|u_0\|_{L^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\tilde{u}_n\|_{L^2} = 1$$

steht. □

6. Klassische Sätze der Funktionalanalysis

Zu den klassischen Sätzen der Funktionalanalysis gehören der Satz von Baire mit seinen Folgerungen und der Satz von Hahn-Banach. Die Folgerungen aus diesen Sätzen werden von entscheidender Bedeutung für die ganze Operatortheorie sein.

Das Prinzip der offenen Abbildung ist eine Folgerung aus dem Satz von Baire und erlaubt recht schnell wichtige Aussagen über das Spektrum unbeschränkter Operatoren. Hier werden auch die ersten Begriffe der Operatortheorie definiert, wie etwa die Abgeschlossenheit eines unbeschränkten Operators.

a) Der Satz von Baire

Sei (X, d) metrischer Raum. Eine Menge $A \subset X$ heißt nirgends dicht, falls $\overset{\circ}{\bar{A}}$ keine inneren Punkte enthält, d. h. $\overset{\circ}{\bar{A}} = \emptyset$. Dies ist äquivalent dazu, dass \bar{A} keine offene Kugel enthält.

6.1 Satz (Bairescher Kategoriensatz). *Sei (X, d) vollständiger metrischer Raum, $A_n \subset X$ abgeschlossen. Falls $A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ eine offene Kugel enthält, so existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass A_{n_0} (schon) eine offene Kugel enthält.*

Beweis. Sei $B(x_0, r) \subset A$ eine offene Kugel. Angenommen, kein A_n enthält eine offene Kugel, d. h. es gilt

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in X : (X \setminus A_n) \cap B(x, \varepsilon) \neq \emptyset.$$

Wähle x_1 mit $0 < \varepsilon_1 < 1/2$ und

$$B(x_1, \varepsilon_1/2) \subset (X \setminus A_1) \cap B(x_0, r).$$

Da beide Mengen auf der rechten Seite offen sind, ist auch der Durchschnitt offen (und nichtleer).

Wähle nun im nächsten Schritt x_2 mit $B(x_2, \varepsilon_2) \subset (X \setminus A_2) \cap B(x_1, \varepsilon_1)$ (offen, nicht leer), $0 < \varepsilon_2 < \frac{1}{4}$.

Allgemein wähle x_n, ε_n mit $B(x_n, \varepsilon_n) \subset (X \setminus A_n) \cap B(x_{n-1}, \varepsilon_{n-1})$ und $0 < \varepsilon_n < 2^{-n}$.

Wegen $\varepsilon_n \rightarrow 0$ und $x_n \in B(x_{n-1}, \varepsilon_{n-1})$ ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchyfolge, d.h. $x_n \rightarrow x \in X$. Hier verwenden wir, dass X vollständig ist. Wegen $d(x, x_n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \underbrace{d(x_m, x_n)}_{< \varepsilon_n/2 \text{ falls } m \geq n} < \varepsilon_n$

ist $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_{\varepsilon_n}(x_n)$.

Aber es gilt sowohl

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \varepsilon_n) \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_n) = X \setminus A$$

als auch

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \varepsilon_n) \subset B(x_1, \varepsilon_1) \subset B(x_0, r) \subset A.$$

Somit ist $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \varepsilon_n) = \emptyset$ im Widerspruch zu $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B(x_n, \varepsilon_n)$. \square

Satz 6.1 heißt aus folgendem Grund Kategoriensatz: Eine Menge $A \subset X$ heißt von erster Kategorie (mager) in X , falls $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ mit nirgends dichten Mengen A_n gilt. Gibt es keine solche Darstellung, heißt A von von zweiter Kategorie.

Damit erhalten wir folgende Formulierung des Satzes von Baire: Sei (X, d) vollständiger metrischer Raum. Dann ist X ist von zweiter Kategorie in sich.

6.2 Satz (Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit). Sei (X, d) vollständiger metrischer Raum, \mathcal{T} eine Familie stetiger Abbildungen $f : X \rightarrow \mathbb{K}$. Die Familie \mathcal{T} sei punktweise gleichmäßig beschränkt, d.h. es gilt

$$\forall x \in X \exists c_x > 0 \forall f \in \mathcal{T} : |f(x)| \leq c_x.$$

Dann existiert eine offene Kugel K und ein $c > 0$ mit

$$\forall x \in K \forall f \in \mathcal{T} : |f(x)| \leq c.$$

Beweis. Die Menge $A_n := \{x \in X \mid \forall f \in \mathcal{T} : |f(x)| \leq n\}$ ist abgeschlossen. Für $x \in X$ existiert nach Voraussetzung ein $c_x > 0$ mit $|f(x)| \leq c_x$ ($f \in \mathcal{T}$), d. h. es existiert eine natürliche Zahl n mit $x \in A_n$. Somit $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Nach dem Satz von Baire existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ und eine offene Kugel $K \subset A_{n_0}$. Damit ist $|f(x)| \leq n_0$ ($x \in K, f \in \mathcal{T}$). \square

6.3 Satz (Satz von Banach-Steinhaus). Sei X Banachraum und Y normierter Raum. Sei $\mathcal{T} \subset L(X, Y)$ eine punktweise gleichmäßig beschränkte Familie, d. h. es gelte

$$\forall x \in X \exists c_x > 0 \forall T \in \mathcal{T} : \|Tx\| \leq c_x.$$

Dann existiert ein $c > 0$ mit $\|T\| \leq c$ ($T \in \mathcal{T}$).

Beweis. Definiere $\mathcal{T}' := \{f_T : X \rightarrow \mathbb{K}, T \in \mathcal{T}\}$ mit $f_T(x) := \|Tx\|$. Nach Voraussetzung ist die Familie \mathcal{T}' punktweise gleichmäßig beschränkt.

Nach Satz 6.2 existieren $B(x_0, r_0)$ und $c' > 0$ mit

$$\forall x \in B(x_0, r_0) \forall T \in \mathcal{T} : \|Tx\| \leq c'.$$

Sei nun $x \in X, \|x\| = 1$ und $T \in \mathcal{T}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \frac{2}{r_0} \left\| T\left(\frac{r_0}{2}x - x_0 + x_0\right) \right\| \leq \\ &\leq \frac{2}{r_0} \left(\underbrace{\left\| T\left(\frac{r_0}{2}x - x_0\right) \right\|}_{\in B(x_0, r_0)} + \underbrace{\|Tx_0\|}_{\in B(x_0, r_0)} \right) \leq \frac{4}{r_0} c' =: c. \end{aligned}$$

Somit gilt $\|T\| \leq c \quad (T \in \mathcal{T})$. □

6.4 Satz (Prinzip der offenen Abbildung). Seien X, Y Banachräume und $T \in L(X, Y)$ surjektiv. Dann ist T offen, d.h. das Bild einer offenen Menge ist offen.

Beweis. (i) Wir zeigen zunächst, dass ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B(0, \varepsilon) \subset \overline{TB(0, 1)}$. Sei dazu $B_n := B(0, n) \subset X$. Da T surjektiv ist, gilt $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{T(B_n)}$. Nach dem Satz von Baire ist das Innere von $\overline{T(B_n)}$ für ein $n \in \mathbb{N}$ nichtleer, d.h. es existiert ein $\varepsilon_0 > 0$ und ein $y_0 \in Y$ mit $B(y_0, \varepsilon_0) \subset \overline{T(B_n)}$.

Da T surjektiv ist, existiert ein $x_0 \in X$ mit $Tx_0 = y_0$. Es ist $B(y_0, \varepsilon_0) = Tx_0 + B(0, \varepsilon_0)$ und damit

$$\begin{aligned} B(0, \varepsilon_0) &\subset \overline{T(B_n) - Tx_0} = \overline{T(B_n) - Tx_0} \\ &= \overline{T(nB_1) - Tx_0} = \overline{T(nB_1 - x_0)} \subset \overline{T(mB_1)} = m \overline{T(B_1)} \end{aligned}$$

für ein $m \in \mathbb{N}$. Beachte dabei, dass $nB_1 - x_0 \subset mB_1$ für großes m gilt. Wir erhalten

$$B(0, \varepsilon_0/m) \subset \overline{T(B_1)}.$$

Wähle $\varepsilon := \varepsilon_0/m$.

(ii) Wir zeigen nun, dass $\overline{T(B_1)} \subset T(B_2)$ gilt. Dazu sei $y \in \overline{T(B_1)}$ und ε wie in (i). Wähle $x_1 \in B_1$ mit $y - Tx_1 \in B(0, \varepsilon/2)$.

Nach (i) ist $B(0, \varepsilon/2) \subset \overline{TB(0, \frac{1}{2})}$. Wähle nun $x_2 \in B(0, \frac{1}{2})$ mit $y - Tx_1 - Tx_2 \in B(0, \varepsilon/4) \subset \overline{TB(0, \frac{1}{4})}$.

Wir erhalten iterativ eine Folge $(x_n)_n$ mit $x_n \in B(0, 2^{-n+1})$ mit $y - \sum_{i=1}^n Tx_i \in B(0, \varepsilon \cdot 2^{-n})$. Nach Wahl der x_n ist $x := \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ absolut konvergent. Es gilt $x \in B_2$ wegen $\|x\| \leq \sum_n \|x_n\| < 2$.

Unter Verwendung der Stetigkeit von T erhalten wir $y = \sum_{i=1}^{\infty} Tx_i = T(\sum_{i=1}^{\infty} x_i) = Tx \in TB_2$.

(iii) Nach (i) und (ii) ist $K_\varepsilon \subset TB_2$. Also enthält das Bild jeder Umgebung von $0 \in X$ eine offene Kugel in Y , d.h. ist eine Umgebung von $0 \in Y$. Sei nun $U \subset X$ offen. Zu $x \in U$ existiert $B(0, \delta)$ mit $x + B(0, \delta) \subset U$.

Damit $T(x + B(0, \delta)) = Tx + TB(0, \delta) \supset Tx + B(0, \tilde{\varepsilon})$ für ein $\tilde{\varepsilon} > 0$, d.h. es existiert eine Umgebung $Tx + B(0, \tilde{\varepsilon})$ von Tx mit $Tx + B(0, \tilde{\varepsilon}) \subset TU$. Somit ist TU offen. \square

6.5 Korollar. Seien X, Y Banachräume, $T : X \rightarrow Y$ abgeschlossener linearer Operator mit Definitionsbereich $D(T)$. Sei $R(T)$ abgeschlossen. Dann ist T offen als Abbildung von $D(T)$ nach $R(T)$ (wobei sowohl $D(T)$ als auch $R(T)$ mit der Spurtopologie versehen werden).

Beweis. Betrachte die Graphennorm $\|x\|_T := \|x\| + \|Tx\|$ ($x \in D(T)$).

Dann ist $\|\cdot\|_T$ eine Norm auf $D(T)$ und $(D(T), \|\cdot\|_T)$ ein Banachraum (da T abgeschlossen ist). Der Operator $\tilde{T} : (D(T), \|\cdot\|_T) \rightarrow Y$, $x \mapsto Tx$, ist stetig.

Eine Teilmenge $U \subset D(T)$ ist offen bzgl. $\|\cdot\|_T$, falls U offen ist bzgl. $\|\cdot\|_X$. Nach Satz 6.4 ist $\tilde{T}U = TU$ offen für U offen. \square

6.6 Satz (Stetigkeit des Inversen). Seien X, Y Banachräume und $T : X \rightarrow Y$ ein abgeschlossener linearer Operator mit $\ker T = \{0\}$ und $R(T)$ abgeschlossen. Dann ist $T^{-1} : R(T) \rightarrow X$ stetig.

Beweis. Dies folgt sofort aus Korollar 6.5 aufgrund der Äquivalenz der Offenheit von T und der Stetigkeit von T^{-1} . \square

6.7 Satz (Satz vom abgeschlossenen Graphen). Seien X, Y Banachräume, $T : X \rightarrow Y$ abgeschlossener linearer Operator. Falls $D(T)$ abgeschlossen ist, so ist T stetig.

Beweis. Da T abgeschlossen ist, ist $G(T)$ mit $\|(x, Tx)\| := \|x\| + \|Tx\|$ als abgeschlossener Unterraum von $X \oplus Y$ ein Banachraum. Die Projektion $\pi_1 : G(T) \rightarrow X$, $(x, Tx) \mapsto x$, ist stetig und damit ein abgeschlossener linearer Operator. Der Wertebereich $R(\pi_1) = D(T)$ ist abgeschlossen. Nach Satz 6.6 ist π_1^{-1} stetig. Ebenso ist $\pi_2 : G(T) \rightarrow Y$, $(x, Tx) \mapsto Tx$, stetig. Damit ist $T = \pi_2 \circ \pi_1^{-1}$ stetig. \square

6.8 Korollar. Seien $X_1 = (X, \|\cdot\|_1)$ und $X_2 = (X, \|\cdot\|_2)$ Banachräume mit

$$\|x\|_1 \leq c\|x\|_2 \quad (x \in X)$$

für eine Konstante $c > 0$.

Dann sind die Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ äquivalent, d.h. es gibt eine Konstante $c' > 0$ mit $c'\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq c\|x\|_2$ ($x \in X$).

Beweis. Satz vom stetigen Inversen, angewendet auf $\text{id}: (X, \|\cdot\|_2) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$, $x \mapsto x$. \square

6.9 Korollar (Satz von Hellinger-Toeplitz). Sei X Hilbertraum und $T: X \rightarrow X$ linearer Operator mit $D(T) = X$ und

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle \quad (x, y \in X).$$

Dann ist T stetig.

Beweis. Zu zeigen ist die Abgeschlossenheit von $G(T)$ in $X \oplus Y$.

Sei $(x, y) = \lim_n (x_n, Tx_n)$, d.h. $x = \lim_n x_n$ und $y = \lim_n Tx_n$. Für $z \in X$ gilt

$$\langle y, z \rangle = \lim_n \langle Tx_n, z \rangle = \lim_n \langle x_n, Tz \rangle = \langle x, Tz \rangle = \langle Tx, z \rangle.$$

Damit folgt $\langle y - Tx, z \rangle = 0$ für alle $z \in X$. Also ist $y - Tx = 0$, d.h. $(x, y) \in G(T)$. \square

b) Hahn-Banach-Sätze

6.10 Satz (Fortsetzungssatz von Hahn-Banach). Sei X ein \mathbb{R} -Vektorraum und $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ konvex, d.h. es gelte

$$p(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha p(x) + (1 - \alpha)p(y) \quad (\alpha \in [0, 1], x, y \in X).$$

Sei ferner $L \subset X$ ein linearer Teilraum und $\lambda: L \rightarrow \mathbb{R}$ linear mit

$$\lambda(x) \leq p(x) \quad (x \in L).$$

Dann existiert ein lineares $\Lambda: X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\Lambda|_L = \lambda$ und $\Lambda(x) \leq p(x)$ ($x \in X$).

Beweis. (i) Fortsetzung auf $\tilde{L} := \text{span}\{L, z\} = L \oplus \mathbb{R}z$ mit $z \in X \setminus L$:

Für $y_1, y_2 \in L$ und $\alpha, \beta > 0$ beliebig gilt:

$$\beta\lambda(y_1) + \alpha\lambda(y_2) = \lambda(\beta y_1 + \alpha y_2) = (\alpha + \beta) \cdot \lambda\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} y_1 + \frac{\alpha}{\alpha + \beta} y_2\right)$$

$$\begin{aligned} &\leq (\alpha + \beta)p\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}(y_1 - \alpha z) + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}(y_2 + \beta z)\right) \\ &\leq \beta p(y_1 - \alpha z) + \alpha p(y_2 + \beta z). \end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\frac{1}{\alpha} [\lambda(y_1) - p(y_1 - \alpha z)] \leq \frac{1}{\beta} [p(y_2 + \beta z) - \lambda(y_2)] \quad (6-1)$$

Wähle

$$\tilde{\lambda}(z) := \alpha_0 \in \left[\sup_{y_1 \in L, \alpha > 0} \frac{1}{\alpha} (\lambda(y_1) - p(y_1 - \alpha z)), \inf_{y_2 \in L, \beta > 0} \frac{1}{\beta} (p(y_2 + \beta z) - \lambda(y_2)) \right]$$

und definiere $\tilde{\lambda}(\mu z + y) := \mu \tilde{\lambda}(z) + \lambda(y)$ auf $\tilde{L} = L \oplus \mathbb{R} \cdot z$.

$\tilde{\lambda}$ ist linear auf \tilde{L} nach Definition, und es gilt

$$\tilde{\lambda}(\mu z + y) = \mu \alpha_0 + \lambda(y) \leq p(\mu z + y).$$

Denn für $\mu > 0$ gilt nach Wahl von α_0 die Abschätzung

$$p(y_2 + \beta z) \geq \lambda(y_2) + \beta \alpha_0.$$

Setze nun $y_2 := y$ und $\beta := \mu$. Den Fall $\mu < 0$ sieht man analog.

(ii) Sei \mathcal{M} die Menge aller Abbildungen $m : M \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem linearen Unterraum $M \supset L$, welche linear sind und für welche gilt $m|_L = \lambda$ und $m \leq p|_M$.

Durch

$$m_1 \leq m_2 : \iff M_1 \subset M_2, m_2|_{M_1} = m_1$$

wird \mathcal{M} partiell geordnet. Sei $\{m_k\}$ eine Kette in \mathcal{M} . Dann ist $M := \bigcup_k M_k$ ein linearer Unterraum, und durch

$$m(x) := m_k(x) \quad (x \in M_k)$$

wird eine obere Schranke $m \in \mathcal{M}$ der Kette definiert. Nach dem Zornschen Lemma existiert ein maximales Element $\Lambda \in \mathcal{M}$.

Da Λ maximal ist, ist Λ auf ganz X definiert. Sonst existiert nach (i) eine Fortsetzung auf $D(\Lambda) \oplus \mathbb{R} \cdot z$ mit $z \in X \setminus D(\Lambda)$. \square

6.11 Satz (Hahn-Banach, komplexe Version). Sei X ein \mathbb{C} -Vektorraum und $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung mit

$$p(\alpha x + \beta y) \leq |\alpha| p(x) + |\beta| p(y) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ mit } |\alpha| + |\beta| = 1).$$

Sei $L \subset X$ linearer Teilraum und $\lambda : L \rightarrow \mathbb{C}$ linear mit $|\lambda(x)| \leq p(x)$ ($x \in L$). Dann existiert ein lineares $\Lambda : X \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\Lambda|_L = \lambda$ und $|\Lambda(x)| \leq p(x)$ ($x \in X$).

Beweis. Setze $\ell(x) := \operatorname{Re} \lambda(x)$. Dann ist $\ell : X \rightarrow \mathbb{R}$ linear mit

$$\ell(x) \leq \lambda(x) \leq p(x) \quad (x \in L).$$

Wegen $\ell(ix) = -\operatorname{Im} \lambda(x)$ ist $\lambda(x) = \ell(x) - i\ell(ix)$. Setze ℓ nach Satz 6.10 fort zu einem \mathbb{R} -linearen $L : X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $L(x) \leq p(x) \quad (x \in X)$. Dann ist

$$\Lambda(x) := L(x) - iL(ix)$$

\mathbb{R} -linear. Wegen

$$\Lambda(ix) = L(ix) - iL(-x) = L(ix) + iL(x) = i\Lambda(x)$$

ist Λ sogar \mathbb{C} -linear.

Für $\theta := \arg \Lambda(x)$ gilt:

$$|\Lambda(x)| = e^{-i\theta} \Lambda(x) = \Lambda(e^{-i\theta} x) = L(e^{-i\theta} x) \leq p(e^{-i\theta} x) = p(x).$$

Hier wurde $\operatorname{Re} \Lambda = L$ und $\Lambda(e^{-i\theta} x) = |\Lambda(x)| \in \mathbb{R}$ verwendet. □

6.12 Korollar. Sei X normiert, $L \subset X$ linearer Teilraum und $\lambda \in L'$. Dann existiert ein $\Lambda \in X'$ mit $\|\Lambda\|_{X'} = \|\lambda\|_{L'}$, $\Lambda|_L = \lambda$.

Beweis. Sei $p(x) := \|\lambda\|_{L'} \cdot \|x\|$. Dann ist $|\lambda(x)| \leq p(x) \quad (x \in L)$.

Nach Satz 6.11 existiert eine Fortsetzung Λ mit

$$|\Lambda(x)| \leq \|\lambda\| \cdot \|x\| \quad (x \in X),$$

d.h. $\Lambda \in X'$ und $\|\Lambda\| \leq \|\lambda\|$. Wegen $\Lambda|_L = \lambda$ ist $\|\Lambda\| = \|\lambda\|$. □

Damit können wir nun den Beweis von Lemma 3.21 nachholen.

6.13 Korollar. Sei X normiert, $x \in X \setminus \{0\}$ fest. Dann existiert ein $\Lambda \in X'$ mit $\Lambda(x) = \|x\|$ und $\|\Lambda\| = 1$.

Beweis. Definiere $\lambda : \mathbb{K}x \rightarrow \mathbb{K}$, $\lambda(\alpha x) := |\alpha| \|x\|$ und setze nach Korollar 6.12 fort. □

6.14 Korollar. Sei X normiert, $L \subset X$ linearer Teilraum und $x \in X$. Sei

$$d := \inf_{y \in L} \|x - y\| > 0.$$

Dann existiert ein $\Lambda \in X'$ mit $\|\Lambda\| = 1$, $\Lambda(x) = d$ und $\Lambda|_L = 0$.

Beweis. Definiere λ auf $L \oplus \mathbb{K}x$ durch $\lambda(\alpha x + y) := \alpha d$. Dann gilt

$$\|\lambda\| = \sup_{\substack{\alpha \in \mathbb{K} \\ y \in L}} \frac{|\alpha d|}{\|y + \alpha x\|} = \sup_{\substack{\alpha \in \mathbb{K} \\ y \in L}} \frac{d}{\|\frac{y}{\alpha} + x\|} = \frac{d}{\inf_{\substack{y \in L \\ \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}}} \|\frac{y}{\alpha} + x\|} = \frac{d}{d} = 1.$$

Die Behauptung folgt nun aus Korollar 6.12. □

7. Nützliches über das Spektrum

In vielen Anwendungen ist es wichtig, das Spektrum eines Operators gut zu kennen. So kann man etwa am Spektrum ablesen, ob die Lösung einer Differentialgleichung für große Zeiten gegen Null konvergiert (Stabilität). Es gibt eine ganze Reihe kleiner Aussagen über das Spektrum, welche bei der Bestimmung des Spektrum helfen können. Am einfachsten (aus der Sicht des Spektrums gesehen) sind selbstadjungierte Operatoren. Zum Glück sind das auch die Operatoren, welche am häufigsten vorkommen. Für Anwendungen sehr nützlich ist auch der Begriff des approximativen Spektrums.

7.1 Lemma. *Sei X ein \mathbb{C} -Hilbertraum und $T \in L(X)$. Dann ist T genau dann selbstadjungiert, falls $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ gilt für alle $x \in X$.*

Beweis. (i) Sei $T = T^*$. Dann ist $\langle Tx, x \rangle = \langle x, Tx \rangle = \overline{\langle Tx, x \rangle} \in \mathbb{R}$.

(ii) Seien $x, y \in X$ und $\alpha \in \mathbb{C}$. Nach Voraussetzung ist

$$\langle T(x + \alpha y), x + \alpha y \rangle = \overline{\langle T(x + \alpha y), x + \alpha y \rangle}$$

und damit

$$\alpha \langle Ty, x \rangle + \bar{\alpha} \langle Tx, y \rangle = \alpha \langle y, Tx \rangle + \bar{\alpha} \langle x, Ty \rangle.$$

Für $\alpha = 1$ erhält man

$$\langle Ty, x \rangle + \langle Tx, y \rangle = \langle y, Tx \rangle + \langle x, Ty \rangle.$$

Für $\alpha = i$ erhält man

$$\langle Ty, x \rangle - \langle Tx, y \rangle = \langle y, Tx \rangle - \langle x, Ty \rangle.$$

Somit folgt

$$\langle Ty, x \rangle = \langle y, Tx \rangle \quad (x, y \in X).$$

Nach Definition von T^* gilt also $T = T^*$. □

7.2 Bemerkung. Sei X Banachraum, Y normierter Raum und $T: X \rightarrow Y$ ein Isomorphismus normierter Räume, d.h. T linear, bijektiv und T, T^{-1} stetig. Dann ist auch Y ein Banachraum. Denn falls $(y_n)_n \subset Y$ eine Cauchyfolge ist, so auch $x_n := T^{-1}y_n$. Damit existiert $x := \lim_n x_n \in X$, und für $y := Tx \in Y$ gilt $y_n \rightarrow y$.

Man beachte, dass hier die Linearität entscheidend ist, vergleiche $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$.

7.3 Lemma. *Seien X, Y Banachräume und $T: X \rightarrow Y$ abgeschlossener linearer Operator. Dann sind äquivalent:*

- (i) Es existiert ein $C > 0$ mit $\|Tx\| \geq C\|x\|$ ($x \in D(T)$).
(ii) T ist injektiv und $R(T)$ ist abgeschlossen.

Beweis. (i) \Rightarrow (ii). Offensichtlich ist T injektiv. Der Operator $T: (D(T), \|\cdot\|_T) \rightarrow (R(T), \|\cdot\|)$ ist nach (i) Isomorphismus von normierten Räumen. Da $(D(T), \|\cdot\|_T)$ Banachraum ist, ist $R(T)$ abgeschlossen nach Bemerkung 7.2.

(ii) \Rightarrow (i) folgt aus dem Satz vom stetigen Inversen. \square

7.4 Satz (Spektrum selbstadjungierter Operatoren). Sei X ein \mathbb{C} -Hilbertraum und T ein selbstadjungierter linearer (nicht notwendig beschränkter) Operator. Dann gilt

- (i) $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$.
(ii) $\|(T - \lambda)^{-1}\| \leq |\operatorname{Im} \lambda|^{-1}$ ($\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$).
(iii) Für $\lambda \in \sigma_p(T)$ ist $\ker(T - \lambda) = N_\lambda^{(a)}(T)$, d.h. geometrischer und algebraischer Eigenraum sind identisch.
(iv) Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
(v) $\sigma_r(T) = \emptyset$.

Beweis. (i) Sei $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ und $x \in D(T)$. Es gilt mit Lemma 7.1

$$\|(T - \lambda)x\| \cdot \|x\| \geq |\langle (T - \lambda)x, x \rangle| \geq |\operatorname{Im} \langle (T - \lambda)x, x \rangle| = |\operatorname{Im} \lambda| \cdot \|x\|^2. \quad (7-1)$$

Nach Lemma 7.3 ist $T - \lambda$ injektiv und $R(T - \lambda)$ abgeschlossen.

$T - \lambda$ ist surjektiv: Nach Satz 4.16 a) gilt $R(T - \lambda)^\perp = \ker(T - \lambda)^* = \ker(T - \bar{\lambda})$. Nach dem bisher Bewiesenen ist $T - \bar{\lambda}$ injektiv und es folgt $R(T - \lambda)^\perp = \{0\}$. Da $R(T - \lambda)$ abgeschlossen ist, erhalten wir die Surjektivität von $T - \lambda$.

Insgesamt haben wir gezeigt, dass für $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ der Operator $T - \lambda$ bijektiv ist.

(ii) Setze $y := (T - \lambda)x$ in (7-1) und erhalte

$$\|y\| \geq |\operatorname{Im} \lambda| \cdot \|(T - \lambda)^{-1}y\|.$$

(iii) Die Inklusion $\ker(T - \lambda) \subset N_\lambda^{(a)}(T)$ gilt immer. Sei also $x \in N_\lambda^{(a)}(T) \setminus \ker(T - \lambda)$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann gilt $(T - \lambda)^n x = 0$ für ein $n \geq 2$, aber $(T - \lambda)x \neq 0$. Wegen $T = T^*$ ist dann

$$\|(T - \lambda)^{n-1}x\|^2 = \langle (T - \lambda)^n x, (T - \lambda)^{n-2}x \rangle = 0.$$

Induktiv folgt $(T - \lambda)^{n-2}x = 0, \dots, (T - \lambda)x = 0$, Widerspruch.

(iv) Das folgt wie in der linearen Algebra. Seien x_1, x_2 Eigenvektoren zu $\lambda_1 \neq \lambda_2$ mit $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\lambda_1 \langle x_1, x_2 \rangle = \langle Tx_1, x_2 \rangle = \langle x_1, Tx_2 \rangle = \lambda_2 \langle x_1, x_2 \rangle.$$

Wegen $\lambda_1 \neq \lambda_2$ folgt $\langle x_1, x_2 \rangle = 0$.

(v) Angenommen, es existiert ein $\lambda \in \sigma_r(T)$. Dann ist $\lambda \in \mathbb{R}$, $T - \lambda$ injektiv und $R(T - \lambda) \neq X$. Wähle $y \in R(T - \lambda)^\perp \setminus \{0\}$. Dann ist

$$0 = \langle (T - \lambda)x, y \rangle = \langle x, (T - \lambda)y \rangle \quad (x \in D(T)),$$

d.h. $(T - \lambda)y = 0$ und, da $T - \lambda$ injektiv ist, $y = 0$, Widerspruch. \square

Der folgende Satz wird genauso wie Satz 7.4 bewiesen.

7.5 Satz (Spektrum unitärer Operatoren). Sei X ein Hilbertraum und $T \in L(X)$ unitär. Dann gilt

(i) $\sigma(T) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

(ii) $\|(T - \lambda)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\lambda| - 1}$ für $|\lambda| \neq 1$.

Die Aussagen (iii)–(v) von Satz 7.4 gelten analog.

7.6 Definition (numerischer Wertebereich). Sei X ein Hilbertraum und $T \in L(X)$. Der numerische Wertebereich ist definiert durch

$$W(T) := \{\langle Tx, x \rangle : \|x\| = 1\}.$$

7.7 Lemma. Sei X ein Hilbertraum und $T \in L(X)$. Dann gilt $\sigma(T) \subset \overline{W(T)}$.

Beweis. Für $\lambda \notin \overline{W(T)}$ und $\|x\| = 1$ gilt

$$\begin{aligned} 0 < d := \text{dist}(x, \overline{W(T)}) &\leq |\lambda - \langle Tx, x \rangle| = |\langle (\lambda - T)x, x \rangle| \\ &\leq \|(T - \lambda)x\| \cdot \|x\| = \|(T - \lambda)x\|. \end{aligned}$$

Damit gilt $\|(T - \lambda)x\| \geq d\|x\|$ ($x \in X$). Also ist nach Lemma 7.3 der Operator $T - \lambda$ injektiv und $R(T - \lambda)$ abgeschlossen. Falls $x_0 \in R(T - \lambda)^\perp$ mit $\|x_0\| = 1$, so ist

$$0 = \langle (T - \lambda)x_0, x_0 \rangle = \langle Tx_0, x_0 \rangle - \lambda,$$

Widerspruch zu $\lambda \notin \overline{W(T)}$. \square

7.8 Lemma (approximative Eigenwerte). *Seien X, Y Banachräume und $T: X \rightarrow Y$ ein abgeschlossener linearer Operator. Die Menge der approximativen Eigenwerte ist definiert als*

$$\sigma_{\text{app}}(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(T), \|x_n\| = 1 : \|(T - \lambda)x_n\| \rightarrow 0\}.$$

Dann gilt

$$\sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \subset \sigma_{\text{app}}(T) \subset \sigma(T).$$

Beweis. (i) Sei $\lambda \in \sigma_{\text{app}}(T)$. Falls $\lambda \in \rho(T)$, so wäre $\|(T - \lambda)^{-1}\|$ stetig, d.h. für alle $x \in D(T)$ ist

$$\frac{\|x_n\|}{\|(T - \lambda)x_n\|} \leq \|(T - \lambda)^{-1}\| < \infty.$$

Dies ist aber ein Widerspruch zur Definition der approximativen Eigenwerte.

(ii) Für $\lambda \in \sigma_p(T)$ setze $x_n := x$ mit einem normierten Eigenvektor x zum Eigenwert λ .

Sei $\lambda \in \sigma_c(T)$. Dann ist $T - \lambda$ injektiv und $R(T - \lambda)$ nicht abgeschlossen. Nach Lemma 7.3 existiert kein $C > 0$ mit $\|(T - \lambda)x\| \geq C\|x\|$. Somit existiert eine Folge x_n mit $\|x_n\| = 1$ und $\|(T - \lambda)x_n\| \rightarrow 0$. \square

7.9 Lemma. *Sei X ein Hilbertraum und $T \in L(X)$ selbstadjungiert. Für $m := \inf_{\|x\|=1} \langle Tx, x \rangle$ und $M := \sup_{\|x\|=1} \langle Tx, x \rangle$ gilt $\sigma(T) \subset [m, M]$ und $m, M \in \sigma(T)$.*

Beweis. Die Inklusion $\sigma(T) \subset \overline{W(T)} \subset [m, M]$ gilt nach Lemma 7.7.

Sei $(x_n)_n \subset X$ mit $\|x_n\| = 1$ und $\langle Tx_n, x_n \rangle \rightarrow m$. Nach Definition von m ist die Bilinearform $[x, y] := \langle (T - m)x, y \rangle$ positiv semidefinit, und nach Cauchy-Schwarz gilt

$$\begin{aligned} \|(T - m)x_n\|^2 &= [x_n, (T - m)x_n] \leq [x_n, x_n]^{1/2} [(T - m)x_n, (T - m)x_n]^{1/2} \\ &= \langle (T - m)x_n, x_n \rangle^{1/2} \cdot \langle (T - m)^2 x_n, (T - m)x_n \rangle^{1/2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

da $\langle (T - m)x_n, x_n \rangle \rightarrow 0$ und $\langle (T - m)^2 x_n, (T - m)x_n \rangle$ beschränkt ist. Also ist $m \in \sigma_{\text{app}}(T) \subset \sigma(T)$. Genauso zeigt man $M \in \sigma(T)$. \square

7.10 Definition und Satz. *Sei X ein \mathbb{C} -Hilbertraum und $T \in L(X)$. Für den Spektralradius*

$$r(T) := \inf_{n \in \mathbb{N}} \|T^n\|^{1/n}$$

gilt

$$r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}.$$

Beweis. (i) Wir zeigen folgende Aussage: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ mit $0 \leq a_{n+m} \leq a_n a_m$ für alle $n, m \in \mathbb{N}$. Dann gilt $(a_n)^{1/n} \rightarrow a := \inf_n (a_n)^{1/n}$ ($n \rightarrow \infty$).

Um dies zu zeigen, sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $(a_N)^{1/N} < a + \varepsilon$ und setze $b(\varepsilon) := \max\{a_1, \dots, a_N\}$. Schreibe nun $n \in \mathbb{N}$ in der Form $n = kN + r$ mit $0 \leq r < N$. Dann gilt

$$\begin{aligned} (a_n)^{1/n} &= (a_{kN+r})^{1/n} \leq (a_N^k a_r)^{1/n} \\ &\leq (a + \varepsilon)^{kN/n} b^{1/n} = (a + \varepsilon)(a + \varepsilon)^{-r/n} b^{1/n} \\ &= (a + \varepsilon) \left(\frac{b}{(a + \varepsilon)^r} \right)^{1/n} \\ &< a + 2\varepsilon, \end{aligned}$$

falls n hinreichend groß ist. Dies zeigt (i).

(ii) Setze in (i) nun $a_n := \|T^n\|$. Dann folgt $r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n}$. Für $|\lambda| > r(T)$ gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\| \left(\frac{T}{\lambda} \right)^n \right\|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|T^n\|^{1/n}}{|\lambda|} = \frac{r(T)}{|\lambda|} < 1.$$

Damit konvergiert

$$\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{T}{\lambda} \right)^n = \frac{1}{\lambda} \left(1 - \frac{T}{\lambda} \right)^{-1} = (\lambda - T)^{-1}.$$

Also ist $\lambda \in \rho(T)$.

(iii) Sei $r_0 := \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}$. Sei $\mu \in \mathbb{C}$ mit $|\mu| > r_0$, und $f \in [L(X)]'$. Betrachte die Funktion $F(\lambda) := f((\lambda - T)^{-1})$. Dann ist F holomorph in $\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| > r(T)\}$, da die Reihe

$$F(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} f(T^n)$$

absolut konvergent ist für $|\lambda| > r(T)$.

Andererseits ist F holomorph in $\rho(T)$ und damit für alle $|\lambda| > r_0$. Eine Potenzreihe konvergiert aber im größten offenen Kreisring, in dem sie holomorph ist. Daher konvergiert die obige Reihe an der Stelle μ (wegen $|\mu| > r_0$).

Insbesondere folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(\mu^{-n-1} T^n)| \rightarrow 0$. Da $f \in [L(X)]'$ beliebig war, konvergiert die Folge $(\mu^{-n-1} T^n)_{n \in \mathbb{N}}$ in der schwachen Topologie gegen 0.

Die Folge $(\mu^{-n-1} T^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist normbeschränkt: Für jedes $f \in [L(X)]'$ die Folge

$$(f(\mu^{-n-1} T^n))_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$$

als konvergente Folge beschränkt, es existiert also eine Konstante c_f mit $|\widetilde{T}_n(f)| = |f(T_n)| \leq c_f$ ($n \in \mathbb{N}$). Nach dem Satz von Banach-Steinhaus existiert ein $c > 0$ mit $\|\widetilde{T}_n\| \leq c$. Aber es gilt $\|\widetilde{T}_n\| = \|T_n\|$.

Damit gilt

$$\|T^n\|^{1/n} \leq (C|\mu|^{n+1})^{1/n}.$$

Da die rechte Seite für $n \rightarrow \infty$ gegen $|\mu|$ konvergiert, folgt

$$r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} \leq |\mu|.$$

Da die Zahl μ beliebig mit $|\mu| > r_0$ war, folgt $r(T) \leq r_0$. Nach (ii) gilt jedoch auch $r(T) \geq r_0$ und damit $r(T) = r_0$. \square

7.11 Satz. Sei X ein \mathbb{C} -Hilbertraum und $T \in L(X)$ selbstadjungiert. Dann gilt

$$r(T) = \|T\| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\} = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x \rangle|.$$

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \in X, \|x\|=1} \left(\langle Tx, Tx \rangle \right)^{1/2} \\ &= \sup_{x \in X, \|x\|=1} \left(\langle T^2 x, x \rangle \right)^{1/2} \\ &\leq \|T^2\|^{1/2}, \end{aligned}$$

d.h. $\|T\|^2 \leq \|T^2\|$. Die andere Richtung gilt, da $\|\cdot\|$ submultiplikativ ist. Iterativ folgt damit $\|T^{2n}\| = \|T\|^{2n}$ für $n \in \mathbb{N}$. Damit ist $r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} = \|T\|$, und die Behauptung folgt aus Lemma 7.9 und Satz 7.10. \square

7.12 Bemerkung. a) Für nicht selbstadjungierte Operatoren gilt die Aussage von Satz 7.11 i. allg. nicht, wie man an folgendem Beispiel sieht. Sei $X = L_2([0, 1])$ und

$$(Ax)(t) := \int_0^t x(\tau) d\tau.$$

Der Operator A ist ein Beispiel eines Volterra-Operators. Es gilt $\sigma(A) = \{0\}$.

b) Es gibt selbstadjungierte Operatoren, welche keinen Eigenwert besitzen. Betrachte dazu wieder $X = L_2([0, 1])$ und $(Ax)(t) := tx(t)$ (Multiplikationsoperator). Dann ist $\sigma_p(A) = \emptyset$.

7.13 Bemerkung. Die meisten obigen Aussagen und Beweise gelten nicht nur für beschränkte Operatoren in Hilbert- bzw. Banachräumen, sondern allgemein für Elemente von Banachalgebren bzw. C^* -Algebren. Die sog. Gelfand-Theorie von C^* -Algebren ermöglicht es, einen abstrakten Zugang zu Spektrum und Spektralsatz zu finden. Hier sollen nur die Definitionen zitiert werden.

7.14 Definition. a) Eine Banachalgebra A ist ein \mathbb{C} -Banachraum, auf der eine bilineare, assoziative Abbildung $A \times A \rightarrow A$, $(x, y) \mapsto x \cdot y$ definiert ist (die Multiplikation), wobei

$$\|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (x, y \in A).$$

Wir schreiben wieder $xy := x \cdot y$. Die Banachalgebra A heißt kommutativ, falls $xy = yx$ ($x, y \in A$). Ein Element $e \in A$ heißt Einheit von A , falls $xe = ex = x$ ($x \in A$) und $\|e\| = 1$.

b) Eine Abbildung $A \rightarrow A$, $x \mapsto x^*$ heißt Involution, falls gilt

$$(i) \quad (x + y)^* = x^* + y^* \quad (x, y \in A),$$

$$(ii) \quad (\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^* \quad (\lambda \in \mathbb{C}, x \in A),$$

$$(iii) \quad x^{**} = x \quad (x \in A),$$

$$(iv) \quad (xy)^* = y^* x^* \quad (x, y \in A).$$

c) Falls A eine Involution mit

$$\|x^* x\| = \|x\|^2 \quad (x \in A)$$

besitzt, so heißt A eine C^* -Algebra. Ein Algebrenhomomorphismus $\Phi : A \rightarrow B$ von C^* -Algebren heißt ein $*$ -Homomorphismus, falls $\Phi(x^*) = (\Phi(x))^*$ ($x \in A$).

7.15 Beispiele. a) Sei X ein \mathbb{C} -Banachraum. Dann sind $A = L(X)$ und $A = K(X) := \{T \in L(X) : T \text{ kompakt}\}$ Banachalgebren. Dabei hat $L(X)$ die Einheit id_X , während $K(X)$ nur dann eine Einheit hat (nämlich ebenfalls id_X), falls X endlich-dimensional ist.

b) Sei T ein kompakter Hausdorff-Raum. Dann ist $C(T)$ eine Banachalgebra mit der konstanten Funktion 1 als Einheit.

c) Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum. Dann ist $L^\infty(\mu; \mathbb{C})$ eine Banachalgebra mit der konstanten Funktion 1 als Einheit.

8. Der Spektralsatz für selbstadjungierte beschränkte Operatoren

Der Spektralsatz ist einer der wichtigsten Sätze der Operatortheorie. Es handelt sich dabei um eine Verallgemeinerung des bekannten Satzes aus der Linearen Algebra, nach welchem selbstadjungierte Matrizen orthogonal diagonalisierbar sind, also zunächst einmal um eine Strukturaussage. Diese Darstellung linearer selbstadjungierter Operatoren kann nun verwendet werden, um etwa Funktionen von Operatoren zu definieren, was wichtige Anwendungen z.B. für partielle Differentialgleichungen besitzt. Man erhält einen Funktionalkalkül für Operatoren.

Tatsächlich kann man stetige Funktionen von Operatoren auf relativ einfache Weise definieren, indem man die Dichtheit der Polynome im Raum der stetigen Funktionen ausnützt. Polynomiale Abbildungen von Operatoren sind in natürlicher Weise definiert. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Spektralsatz liegt nun darin, den stetigen Funktionalkalkül zu einem messbaren Funktionalkalkül auszudehnen. Dies ist möglich, indem ein Satz von Riesz zur Darstellung der Dualräume der stetigen Funktionen verwendet wird. Der messbare Funktionalkalkül erlaubt es uns schließlich, charakteristische Funktionen von Operatoren zu betrachten, was zur Definition und Darstellung des Spektralmaßes führt. Insgesamt erhält man eine Darstellung eines selbstadjungierten Operators als Integral über eine skalarwertige Funktion, wobei das Maß selbst operatorwertig ist.

In diesem Abschnitt werden nur beschränkte selbstadjungierte Operatoren betrachtet. In vielen Anwendungen sind die Operatoren unbeschränkt, und die Übertragung auf unbeschränkte Operatoren erfolgt später.

a) Stetiger und messbarer Funktionalkalkül

Im folgenden sei stets H ein \mathbb{C} -Hilbertraum.

Wir wollen im folgenden Funktionen $f(T)$ eines selbstadjungierten Operators $T \in L(H)$ definieren. Die Definition ist noch klar, falls f ein Polynom ist: Für $f(t) = \sum_{n=0}^N a_n t^n$ mit $a_n \in \mathbb{C}$ ist

$$f(T) := \sum_{n=0}^N a_n T^n \quad (8-1)$$

(mit $T^0 := \text{id}_H$). Dieser sog. Funktionalkalkül kann mit Hilfe des Satzes von Weierstraß eindeutig auf stetige Funktionen ausgeweitet werden, wie wir später sehen werden. Zunächst eine Version eines Spektralabbildungssatzes.

8.1 Lemma. *Sei $T \in L(H)$, und für ein Polynom f sei $f(T)$ durch (8-1) definiert.*

Dann gilt

$$\sigma(f(T)) = f(\sigma(T)) \left(= \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(T)\} \right).$$

Beweis. (i) Sei $\mu \in \sigma(f(T))$. Wir faktorisieren

$$f(t) - \mu = \beta_n \cdot \prod_{i=1}^n (t - \gamma_i)$$

und erhalten $f(T) - \mu = \beta_n \cdot \prod_{i=1}^n (T - \gamma_i)$. Falls $\gamma_i \in \rho(T)$ für alle i gelten würde, so wäre $f(T) - \mu$ bijektiv, d.h. es gilt $\mu \in \rho(f(T))$. Also existiert ein i_0 , so dass $T - \gamma_{i_0}$ nicht bijektiv ist. Das heißt aber $\gamma_{i_0} \in \sigma(T)$. Wegen $f(\gamma_{i_0}) - \mu = 0$ folgt $\mu \in f(\sigma(T))$.

(ii) Sei nun $\mu \in f(\sigma(T))$, d.h. es gilt $\mu = f(\gamma)$ mit einem $\gamma \in \sigma(T)$. Dann folgt $f(\gamma) - \mu = 0$, d.h.

$$f(t) - \mu = (t - \gamma)\tilde{f}(t)$$

mit einem Polynom \tilde{f} von Grad nicht größer als $n - 1$. Also gilt

$$f(T) - \mu = (T - \gamma)\tilde{f}(T) = \tilde{f}(T)(T - \gamma).$$

Da $\gamma \in \sigma(T)$, ist entweder $T - \gamma$ nicht surjektiv und damit auch $f(T) - \mu$ nicht surjektiv, oder es ist $T - \gamma$ nicht injektiv und damit $f(T) - \mu$ nicht injektiv. In beiden Fällen folgt $\mu \in \sigma(f(T))$. \square

Im folgenden sei $\mathbf{1}$ die konstante Funktion 1 und $P(\sigma(T)) := \{f \in C(\sigma(T)) : f \text{ ist Polynom}\}$.

8.2 Definition und Satz (Stetiger Funktionalkalkül). Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert. Dann existiert genau ein stetiger Homomorphismus von C^* -Algebren $\Phi: C(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$ mit $\Phi(\text{id}_{\sigma(T)}) = T$ und $\Phi(\mathbf{1}) = \text{id}_H$. Die Abbildung Φ heißt der stetige Funktionalkalkül von T . Wir schreiben $f(T) := \Phi(f)$ ($f \in C(\sigma(T))$).

Beweis. (i) Dichtheit der Polynome: Da $T = T^* \in L(H)$, existiert ein Intervall $[m, M] \supset \sigma(T)$. Zu $f \in C(\sigma(T))$ existiert nach dem Erweiterungslemma von Tietze (Satz 1.5) eine stetige Fortsetzung $\tilde{f} \in C([m, M])$. Nach dem Satz von Weierstraß liegen die Polynome dicht in $C([m, M])$ und damit auch dicht in $C(\sigma(T))$.

(ii) Eindeutigkeit: Da Φ stetig ist, ist Φ durch die Werte auf der Menge $P(\sigma(T))$ aller Polynome bereits festgelegt. Wegen $\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g)$ ist Φ bereits durch die Werte $\Phi(\text{id}_{\sigma(T)})$ und $\Phi(\mathbf{1})$ eindeutig bestimmt.

(iii) Existenz von Φ : Für ein Polynom $f \in P(\sigma(T))$, $f: t \mapsto \sum_{j=0}^n c_j t^j$, setze $\Phi(f) := \sum_{j=0}^n c_j T^j$. Dann ist $\Phi: P(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$ linear, multiplikativ und erfüllt $\Phi(\tilde{f}) = (\Phi(f))^*$.

Wir zeigen, dass Φ stetig ist. Für $f \in P(\sigma(T))$ ist

$$\begin{aligned} \|\Phi(f)\|^2 &= \|\Phi(f)^*\Phi(f)\| = \|\Phi(\overline{f}f)\| = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(\Phi(\overline{f}f))\} \\ &= \sup\{(\overline{f}f)(\lambda) : \lambda \in \sigma(T)\} = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |f(\lambda)|^2 = \|f\|_\infty^2. \end{aligned}$$

Hier wurden Satz 7.11 auf den selbstadjungierten Operator $\Phi(\overline{f}f)$ angewendet sowie der Spektralabbildungssatz für Polynome (Lemma 8.1).

Somit ist Φ eine Isometrie auf $P(\sigma(T))$, und es existiert eine eindeutige (wieder isometrische) stetige Fortsetzung auf $C(\sigma(T))$. Diese Fortsetzung ist wieder linear, multiplikativ und erfüllt $\Phi(\overline{f}) = \Phi(f)^*$. Zum Beispiel kann man die letzte Eigenschaft folgendermaßen zeigen: Falls f der Limes von Polynomen f_n ist, so gilt

$$\begin{aligned} \Phi(\overline{f}) &= \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{f}_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(\overline{f}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(f_n)^* \\ &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(f_n)\right]^* = \Phi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\right)^* = \Phi(f)^*. \end{aligned}$$

□

8.3 Satz (Eigenschaften des Funktionalkalküls). Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert.

- a) Der Funktionalkalkül $C(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$, $f \mapsto f(T)$, ist isometrisch, d.h. $\|f(T)\| = \|f\|_\infty$.
- b) Falls $f \geq 0$, so ist $f(T) \geq 0$ ($:\Leftrightarrow \forall x \in H : \langle x, f(T)x \rangle \geq 0$).
- c) Falls $Tx = \lambda x$, so ist $f(T)x = f(\lambda)x$ für $f \in C(\sigma(T))$.
- d) (Spektralabbildungssatz). Es ist $\sigma(f(T)) = f(\sigma(T))$.
- e) Die Menge $\{f(T) : f \in C(\sigma(T))\} \subset L(H)$ ist kommutative Unteralgebra. Der Operator $f(T)$ ist normal, und $f(T)^* = f(T)$ gilt genau dann, wenn $\overline{f} = f$.

Beweis. a) wurde bereits im Beweis von Satz 8.2 gezeigt (für Polynome, welche dicht liegen).

e) ist nach Satz 8.2 klar.

b) Sei $0 \leq f = g^2$ mit $g \in C(\sigma(T))$, $g \geq 0$. Dann ist

$$\langle f(T)x, x \rangle = \langle g^2(T)x, x \rangle = \|g(T)x\|^2 \geq 0,$$

wobei die Selbstadjungiertheit von $g(T)$ ausgenutzt wurde.

c) ist klar für Polynome und folgt für allgemeine Funktionen durch Approximation.

d) (i) Sei $\mu \notin f(\sigma(T))$, d.h. $g := \frac{1}{f-\mu} \in C(\sigma(T))$. Dann ist

$$g(T)(f(T) - \mu) = (g \circ (f - \mu))(T) = \mathbf{1}_{\sigma(T)}(T) = \text{id}_H.$$

Genauso folgt $(f(T) - \mu)g(T) = \text{id}_H$. Also ist $\mu \in \rho(f(T))$.

(ii) Sei nun $\mu \in f(\sigma(T))$, d.h. es gibt ein $\lambda \in \sigma(T)$ mit $\mu = f(\lambda)$. Wähle Polynome $g_n \in P(\sigma(T))$ mit $\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{1}{n}$ (und damit $\|f(T) - g_n(T)\|_{L(H)} \leq \frac{1}{n}$). Nach Lemma 8.1 ist $g_n(\lambda) \in \sigma(g_n(T))$, d.h. es existiert eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset H$ mit $\|x_n\| = 1$ und $\|(g_n(T) - g_n(\lambda))x_n\| \leq \frac{1}{n}$ (approximative Eigenwerte). Somit ist

$$\begin{aligned} \|(f(T) - f(\lambda))x_n\| &\leq \|(f(T) - g_n(T))x_n\| + \|(g_n(T) - g_n(\lambda))x_n\| \\ &\quad + |g_n(\lambda) - f(\lambda)| \cdot \|x_n\| \leq \frac{3}{n}, \end{aligned}$$

d.h. $f(\lambda) \in \sigma(f(T))$. □

Der stetige Funktionalkalkül liefert uns z.B. die Resolvente $R_\lambda(T) := (T - \lambda)^{-1} = f(T)$ mit $f(t) := \frac{1}{t - \lambda} \in C(\sigma(T))$ für $\lambda \in \rho(T)$. Aber eine gute Beschreibung von T erhält man erst über Maße, und dafür brauchen wir noch die charakteristischen Funktionen von T , z.B. $\chi_{[a,b]}(T)$. Dazu reicht der stetige Funktionalkalkül nicht aus, wir brauchen eine messbare Version.

8.4 Lemma (Stetige Bilinearformen). Sei H Hilbertraum, $B : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ mit

- (i) $x \mapsto B(x, y)$ linear ($y \in H$),
- (ii) $y \mapsto B(x, y)$ konjugiert linear ($x \in H$),
- (iii) $|B(x, y)| \leq C\|x\| \cdot \|y\|$ ($x, y \in H$).

Dann existiert genau ein $T \in L(H)$ mit

$$B(x, y) = \langle x, Ty \rangle \quad (x, y \in H).$$

Dabei ist $\|T\|$ die kleinste Konstante C , für die (iii) gilt.

Beweis. Da $x \mapsto B(x, y)$ stetig und linear ist, existiert nach Riesz genau ein \tilde{y} mit $B(x, y) = \langle x, \tilde{y} \rangle$. Setze $Ty := \tilde{y}$. Es ist

$$\begin{aligned} \langle x, \widetilde{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2} \rangle &= B(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \bar{\alpha}_1 B(x, y_1) + \bar{\alpha}_2 B(x, y_2) \\ &= \bar{\alpha}_1 \langle x, \tilde{y}_1 \rangle + \bar{\alpha}_2 \langle x, \tilde{y}_2 \rangle = \langle x, \alpha_1 \tilde{y}_1 + \alpha_2 \tilde{y}_2 \rangle. \end{aligned}$$

Also ist T linear.

Wegen Eigenschaft (iii) ist T stetig: $\|Ty\|^2 = B(Ty, y) \leq C \cdot \|Ty\| \cdot \|y\|$, d.h. $\|T\| \leq C$. □

8.5 Definition. a) Sei (X, \mathcal{A}) ein Messraum. Eine Abbildung $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt ein signiertes Maß, falls für jede Folge paarweise disjunkter Mengen $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ gilt:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Maße $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ mit dieser Eigenschaft heißen komplexe Maße. Die Menge aller \mathbb{K} -wertigen (also signierten bzw. komplexen) Maße wird mit $M(X, \mathcal{A})$ bezeichnet. Falls X ein topologischer Raum mit Borel- σ -Algebra $\mathcal{B}(X)$ ist, so schreibt man $M(X) := M(X, \mathcal{B}(X))$.

b) Zu $\mu \in M(X, \mathcal{A})$ definiert man die Variation (das Variationsmaß) $|\mu|$ durch

$$|\mu|(A) := \sup_{\mathcal{Z}} \sum_{E \in \mathcal{Z}} |\mu(E)|,$$

wobei das Supremum über alle Zerlegungen \mathcal{Z} von A in endlich viele paarweise disjunkten Mengen aus \mathcal{A} gebildet wird. Die Totalvariation oder Variationsnorm von μ ist definiert durch $\|\mu\| := |\mu|(X)$.

8.6 Bemerkung. Man kann zeigen, dass $|\mu|$ ein endliches (positives) Maß auf \mathcal{A} ist. Es gilt ferner: $M(X, \mathcal{A})$, versehen mit der Variationsnorm, ist ein Banachraum. Beweise finden sich z.B. in [13].

8.7 Satz (Rieszscher Darstellungssatz). Sei X ein kompakter topologischer Raum. Dann ist die Abbildung

$$T: M(X) \rightarrow C(X)', \quad \mu \mapsto T\mu \quad \text{mit} \quad (T\mu)(f) := \int_X f d\mu$$

ein isometrischer Isomorphismus von Banachräumen.

Dieser Satz wird hier nicht bewiesen, siehe z.B. [13].

8.8 Lemma. Sei $X \subset \mathbb{C}$ kompakt und nichtleer. Sei $C(X) \subset U \subset B(X)$, wobei $B(X)$ der Raum der beschränkten messbaren Funktionen auf M sei. Es sei U abgeschlossen bzgl. punktweiser gleichmäßig beschränkter Konvergenz, d.h. falls $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset U$ mit $\sup_n \|f_n\|_{\infty} < \infty$ und $f_n \rightarrow f$ ($n \rightarrow \infty$) punktweise gilt, so folgt $f \in U$. Dann gilt bereits $U = B(X)$.

Beweis. (a) Sei V der Durchschnitt aller Mengen S mit $C(X) \subset S \subset B(X)$, welche abgeschlossen sind bzgl. punktweiser gleichmäßig beschränkter Konvergenz. Wir werden zeigen, dass $V = B(X)$ gilt, damit folgt auch $U = B(X)$. Offensichtlich gilt $C(X) \subset V$.

Wir zeigen, dass V ein Vektorraum ist. Sei zunächst $f \in C(X)$ fest. Dann gelten für $V_f := \{h \in B(X) : f + h \in V\}$ die Eigenschaften $C(X) \subset V_f$, und V_f ist abgeschlossen bzgl. obiger Konvergenz. Damit folgt $V_f \supset V$.

Für jedes $g \in V$ und jedes $f \in C(X)$ gilt also $g \in V_f$, d.h. $f + g \in V$. Damit ist $V_g \supset C(X)$, und da V_g ebenfalls abgeschlossen ist bzgl. obiger Konvergenz, folgt $V_g \supset V$. Insgesamt erhalten wir $f + g \in V$ für alle $f, g \in V$. Genauso zeigt man, dass V bzgl. Skalarmultiplikation abgeschlossen ist.

(b) Wir zeigen, dass $V = B(X)$ gilt: Da die Stufenfunktionen im Raum $B(X)$ der beschränkten messbaren Funktionen dicht liegen, reicht es zu zeigen, dass jede Stufenfunktion in V liegt. Dazu zeigen wir, dass jede Stufenfunktion durch stetige Funktionen approximiert werden kann. Dazu reicht es, die charakteristischen Funktionen zu approximieren.

Sei also $\mathcal{B}(X)$ die σ -Algebra der Borelmengen von M und

$$\mathcal{F} := \{A \in \mathcal{B}(X) : \chi_A \in V\}.$$

Falls A offen ist, existiert eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C(X)$ mit $0 \leq f_n \leq 1$ und $f_n(t) \rightarrow \chi_A(t)$ ($n \rightarrow \infty$) für alle $t \in X$. Also sind alle offenen Mengen in \mathcal{F} enthalten.

Wir zeigen, dass folgende Aussagen gelten:

(i) Falls $A, B \in \mathcal{F}$ mit $A \subset B$, so ist auch $B \setminus A \in \mathcal{F}$. Denn es gilt $\chi_{B \setminus A} = \chi_B - \chi_A$, und da V ein Vektorraum ist, folgt $\chi_{B \setminus A} \in V$.

(ii) Seien $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ paarweise disjunkt. Dann ist auch $A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$. Denn es gilt $\chi_A = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n}$, d.h. χ_A ist punktweiser Limes von Funktionen in V und damit selbst in V .

Die Eigenschaften (i) und (ii) sagen, dass \mathcal{F} ein Dynkinsystem ist. Da die offenen Mengen ein durchschnittstabiles Erzeugendensystem dieses Dynkinsystems bilden, ist \mathcal{F} eine σ -Algebra. Damit ist $\mathcal{F} = \mathcal{B}(X)$, d.h. jede Stufenfunktion liegt in V , was zu zeigen war. \square

8.9 Satz (Messbarer Funktionalalkül). Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert. Dann gibt es genau eine Abbildung $\Phi: B(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$ mit

- (i) $\Phi(\text{id}_{\sigma(T)}) = T$, $\Phi(\mathbf{1}) = \text{id}_H$.
- (ii) Φ ist ein stetiger $*$ -Homomorphismus von C^* -Algebren.
- (iii) Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B(\sigma(T))$ mit $\sup_n \|f_n\|_{\infty} < \infty$ und $f_n(t) \rightarrow f(t)$ ($t \in \sigma(T)$). Dann folgt $\langle \Phi(f_n)x, y \rangle \rightarrow \langle \Phi(f)x, y \rangle$ ($x, y \in H$).

Beweis. (i) Eindeutigkeit: Durch (i)-(ii) wird $\Phi(f)$ für $f \in C(\sigma(T))$ bereits festgelegt (siehe Satz 8.2). Nach (iii) ist Φ eindeutig bestimmt für alle Funktionen, welche

punktweiser Limes von stetigen Funktionen sind. Nach Lemma 8.8 ist dies aber schon $B(\sigma(T))$.

(ii) Existenz: Seien $x, y \in H$. Dann definiert

$$\ell_{x,y}: C(\sigma(T)) \rightarrow \mathbb{C}, f \mapsto \langle f(T)x, y \rangle$$

eine stetige Linearform. Dabei ist die Linearität klar, die Stetigkeit folgt aus

$$|\ell_{x,y}(f)| \leq \|f(T)x\| \cdot \|y\| = \|f\|_\infty \cdot \|x\| \cdot \|y\|.$$

Hier wurde der stetige Funktionalkalkül Satz 8.3 verwendet. Nach dem Rieszschen Darstellungssatz 8.7 existiert ein komplexes Maß $\mu_{x,y} \in M(\sigma(T))$ mit

$$\langle f(T)x, y \rangle = \int_{\sigma(T)} f d\mu_{x,y} \quad (f \in C(\sigma(T))) \quad (8-2)$$

Ebenfalls nach Satz 8.7 gilt $\|\mu_{x,y}\| = \|\ell_{x,y}\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$. Die rechte Seite ist aber nicht nur für stetige f , sondern für beschränkte messbare $f \in B(\sigma(T))$ definiert. Für $f \in B(\sigma(T))$ betrachte also die Abbildung

$$(x, y) \mapsto \int_{\sigma(T)} f d\mu_{x,y}.$$

Diese Abbildung ist bilinear, und wegen

$$\left| \int_{\sigma(T)} f d\mu_{x,y} \right| \leq \|f\|_\infty \|\mu_{x,y}\| \leq \|f\|_\infty \cdot \|x\| \cdot \|y\|$$

auch stetig. Nach Lemma 8.4 über stetige Bilinearformen existiert also ein eindeutiger Operator $\Phi(f)$ mit $\|\Phi(f)\| \leq \|f\|_\infty$ und

$$\langle \Phi(f)x, y \rangle = \int_{\sigma(T)} f d\mu_{x,y} \quad (x, y \in H).$$

Wir müssen noch die Eigenschaften (i)–(iii) des eben definierten Funktionalkalküls nachweisen. Dabei ist (i) klar, da $\Phi(f) = f(T)$ für stetige Funktionen gilt. Auch die Stetigkeit von Φ ist nach Konstruktion klar.

Zu (iii): Nach dem Satz über majorisierte Konvergenz folgt

$$\langle \Phi(f_n)x, y \rangle = \int_{\sigma(T)} f_n d\mu_{x,y} \rightarrow \int_{\sigma(T)} f d\mu_{x,y} = \langle \Phi(f)x, y \rangle.$$

Zu (ii): Sei $g \in C(\sigma(T))$ fest. Setze

$$U := \{f \in B(\sigma(T)) : \Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g)\}.$$

Nach Satz 8.3 gilt $C(\sigma(T)) \subset U$. Wir zeigen, dass U bzgl. punktwiser gleichmäßig beschränkter Konvergenz abgeschlossen ist. Seien $f_n \in U$ mit $\sup_n \|f_n\|_\infty < \infty$ und $f = \lim_n f_n$ punktweise. Dann gilt nach (iii)

$$\langle \Phi(fg)x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \Phi(f_n g)x, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \Phi(f_n)\Phi(g)x, y \rangle = \langle \Phi(f)\Phi(g)x, y \rangle.$$

Somit ist $f \in U$. Nach Lemma 8.8 folgt $U = B(\sigma(T))$ und damit ist Φ multiplikativ. Genauso zeigt man, dass $\Phi(\bar{f}) = \Phi(f)^*$ gilt. \square

Wir schreiben wieder $f(T)$ statt $\Phi(f)$. Das nächste Lemma zeigt, dass sogar Konvergenz in der starken Operatorortopologie vorliegt.

8.10 Lemma. Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert und $C(\sigma(T)) \rightarrow B(H)$, $f \mapsto f(T)$ der messbare Funktionalkalkül. Falls $(f_n)_n \subset B(\sigma(T))$ mit $\sup_n \|f_n\|_\infty$ und $f_n \rightarrow f$ punktweise, so gilt $f_n(T)x \rightarrow f(T)x$ für alle $x \in H$.

Beweis. In einem Hilbertraum gilt $z_n \rightarrow z$ in der Normtopologie genau dann, wenn $z_n \rightarrow z$ in der schwachen Topologie und $\|z_n\| \rightarrow \|z\|$ gilt. Dies folgt sofort aus

$$\|z_n - z\|^2 = \|z_n\|^2 - 2 \operatorname{Re}\langle z_n, z \rangle + \|z\|^2.$$

In der Situation von Satz 8.9 haben wir die schwache Konvergenz von $f_n(T)x$ gegen $f(T)x$ nach (iii). Die Konvergenz der Norm folgt aus

$$\begin{aligned} \|f_n(T)x\|^2 &= \langle f_n(T)x, f_n(T)x \rangle = \langle f_n(T)^* f_n(T)x, x \rangle = \langle (\bar{f}_n f_n)(T)x, x \rangle \\ &\rightarrow \langle (\bar{f} f)(T)x, x \rangle = \|f(T)x\|^2. \end{aligned}$$

\square

b) Orthogonale Projektionen

8.11 Definition. Sei H ein Hilbertraum und $M \subset H$ ein abgeschlossener Unterraum. Dann heißt $P : H \rightarrow H$, $x \mapsto x_1$ mit $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in M$, $x_2 \in M^\perp$, die orthogonale Projektion von H auf M .

8.12 Lemma. a) Sei P eine orthogonale Projektion. Dann ist P stetig mit

$$\|P\| = \begin{cases} 1, & M \neq \{0\}, \\ 0, & M = \{0\}. \end{cases}$$

Es gilt $\ker P = M^\perp$ und $R(P) = M$.

b) Ein Operator $P \in L(H)$ ist genau dann orthogonale Projektion, wenn $P^2 = P = P^*$.

Beweis. a) Es gilt unter Verwendung des Satzes von Pythagoras

$$\|Px\|^2 = \|x_1\|^2 \leq \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 = \|x\|^2,$$

d.h. $P \in L(H)$ und $\|P\| \leq 1$. Für $M = \{0\}$ ist $P = 0$. Sonst gilt für $x \in M \setminus \{0\}$ die Gleichheit $x = Px$ und damit $\|P\| = 1$.

b) (i). Sei P eine orthogonale Projektion. Die Gleichheit $P^2 = P$ ist klar nach Definition von P . Seien $x, y \in H$ mit $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$, wobei $x_1, y_1 \in M$ und $x_2, y_2 \in M^\perp$. Dann gilt

$$\langle Px, y \rangle = \langle x_1, y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle + \underbrace{\langle x_1, y_2 \rangle}_{=0} = \langle x, y_1 \rangle = \langle x, Py \rangle,$$

d.h. es gilt $P = P^*$.

(ii). Es gilt $P^2 = P = P^*$. Setze $M := R(P)$. Für $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ mit $x_n \rightarrow x$ und $x_n = Py_n$, ist

$$Px_n = P^2y_n = Py_n = x_n \quad (8-3)$$

und damit

$$\|x_n - Px\| = \|P(x_n - x)\| \leq \|P\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

d.h. $Px = x$. Somit ist M abgeschlossen.

Sei \tilde{P} die orthogonale Projektion zum Unterraum M . Für $x \in H$ und $y \in M$ gilt

$$\langle \tilde{P}x, y \rangle = \langle x, \tilde{P}y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, Py \rangle = \langle Px, y \rangle.$$

Dabei wurde im zweiten Gleichheitszeichen $y \in M$ verwendet, für das dritte Gleichheitszeichen wurde (8-3) verwendet und für die letzte Gleichheit $P = P^*$. Setzt man $y := \tilde{P}x - Px \in M$, so folgt

$$0 = \langle \tilde{P}x - Px, y \rangle = \|(\tilde{P} - P)x\|^2.$$

Also gilt $\tilde{P} = P$, und P ist eine orthogonale Projektion. □

8.13 Lemma. Sei H ein Hilbertraum, und seien P_1, P_2 orthogonale Projektionen auf M_1 bzw. M_2 .

a) P_1P_2 ist genau dann orthogonale Projektion, falls $P_1P_2 = P_2P_1$ gilt. In diesem Fall ist P_1P_2 orthogonale Projektion auf den Unterraum $M_1 \cap M_2$.

b) Es sind äquivalent:

(i) $M_1 \subset M_2$.

- (ii) Es gilt $\|P_1x\| \leq \|P_2x\|$ ($x \in H$).
- (iii) Es gilt $P_1 \leq P_2$, d.h. $\langle P_1x, x \rangle \leq \langle P_2x, x \rangle$ ($x \in H$).
- (iv) Es gilt $P_1P_2 = P_2P_1 = P_1$.

Beweis. a) (i). Es gelte $P_1P_2 = P_2P_1$. Dann erhalten wir

$$(P_1P_2)^2 = P_1P_2P_1P_2 = P_1^2P_2^2 = P_1P_2$$

und

$$(P_1P_2)^* = (P_2P_1)^* = P_1^*P_2^* = P_1P_2.$$

Also ist P_1P_2 eine orthogonale Projektion.

(ii). Sei P_1P_2 orthogonale Projektion. Dann gilt für $x, y \in H$

$$\langle x, P_2P_1y \rangle = \langle x, P_2^*P_1^*y \rangle = \langle P_1P_2x, y \rangle = \langle x, P_1P_2y \rangle.$$

Daher ist $P_1P_2 = P_2P_1$.

In diesem Fall gilt $R(P_2P_1) \subset R(P_2) = M_2$ und $R(P_2P_1) = R(P_1P_2) \subset M_1$. Zu $x \in M_1 \cap M_2$ ist $x = P_1x = P_2x$, d.h. $(P_2P_1)x = x$. Insgesamt erhalten wir $R(P_2P_1) = M_1 \cap M_2$.

Der Beweis von Teil b) wird dem Leser als Übung überlassen. \square

Sei H ein \mathbb{C} -Hilbertraum.

8.14 Lemma. Sei $(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L(H)$ eine Folge orthogonaler Projektionen in einem Hilbertraum H mit $P_m \leq P_n$ für $m \leq n$. Dann konvergiert P_n stark gegen eine orthogonale Projektion $P \in L(H)$.

Beweis. Für $x \in H$ ist $(\|P_nx\|)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt, monoton steigend (Lemma 8.13 b)), also konvergent. Für $m \leq n$ ist

$$\begin{aligned} \|P_nx - P_mx\|^2 &= \underbrace{\langle P_nx, P_nx \rangle}_{=\|P_nx\|^2} - \underbrace{\langle P_nx, P_mx \rangle}_{=\langle P_mP_nx, x \rangle = \langle P_mx, x \rangle = \|P_mx\|^2} - \langle P_mx, P_nx \rangle + \underbrace{\langle P_mx, P_mx \rangle}_{=\|P_mx\|^2} \\ &= \|P_nx\|^2 + \|P_mx\|^2 - 2\|P_mx\|^2 \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Also existiert $Px := \lim_{n \rightarrow \infty} P_nx$ ($x \in H$).

Es gilt $\langle Px, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle P_nx, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, P_ny \rangle = \langle x, Py \rangle$ und

$$\langle P^2x, y \rangle = \langle Px, Py \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle P_nx, P_ny \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle P_nx, y \rangle = \langle Px, y \rangle.$$

Somit gilt $P^2 = P = P^*$ und $P_n \xrightarrow{s} P$. \square

c) Projektorwertige Maße und der Spektralsatz

8.15 Definition. Sei (X, \mathcal{A}) ein Messraum. Eine Abbildung $H: \mathcal{A} \rightarrow L(H)$ heißt ein projektorwertiges Maß (PV-Maß), falls gilt:

- (i) $E(A)$ ist orthogonale Projektion ($A \in \mathcal{A}$).
- (ii) Seien $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ paarweise disjunkt. Dann gilt

$$\left[E\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \right] x = \sum_{n \in \mathbb{N}} E(A_n)x \quad (x \in H).$$

- (iii) Es gilt $E(X) = \text{id}_H$.

Eine Menge $A \in \mathcal{A}$ heißt eine E -Nullmenge, falls $E(A) = 0$ (dabei ist die 0 auf der rechten Seite der Nulloperator in H).

Falls X topologischer Raum ist und $\mathcal{A} = \mathcal{B}(X)$ die Borel- σ -Algebra, so besitzt das PV-Maß kompakten Träger, falls eine kompakte Menge $K \in \mathcal{B}(X)$ existiert mit $E(K) = \text{id}_H$.

8.16 Bemerkung. Sei E ein PV-Maß. Dann gilt

- a) $E(\emptyset) = 0$.
- b) $E(A \cup B) + E(A \cap B) = E(A) + E(B) \quad (A, B \in \mathcal{A})$.
- c) $E(B \setminus A) = E(B) - E(A)$ für $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \subset B$.
- d) Seien $A_n \in \mathcal{A}$ mit $A_n \subset A_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N})$. Dann ist $E(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \text{s-lim}_{n \rightarrow \infty} E(A_n)$. Analog gilt für $A_n \in \mathcal{A}$ mit $A_n \supset A_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N})$ die Gleichheit $E(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \text{s-lim}_{n \rightarrow \infty} E(A_n)$.
- e) $E(A \cap B) = E(A)E(B) = E(B)E(A) \quad (A, B \in \mathcal{A})$.
- f) Seien $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \cap B = \emptyset$. Dann ist $R(E(A)) \perp R(E(B))$.
- g) Sei $x \in H$. Dann ist $E_x: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$ mit

$$E_x(A) := \langle E(A)x, x \rangle = \|E(A)x\|^2$$

ein endliches Maß mit $\|E_x\| = E_x(X) = \|x\|^2$.

- h) Seien $x, y \in H$. Dann ist $E_{x,y}: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$E_{x,y}(A) := \langle E(A)x, y \rangle$$

ein komplexes Maß mit $\|E_{x,y}\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.

8.17 Definition. Sei (X, \mathcal{A}) ein Messraum, E ein PV-Maß. Sei $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ eine Stufenfunktion, d.h. es existiert eine Darstellung der Form $f = \sum_{i=1}^n f_i \chi_{A_i}$ mit $f_i \in \mathbb{C}$ und $A_i \in \mathcal{A}$ disjunkt. Dann heißt

$$\int f dE := \sum_{i=1}^n f_i E(A_i) \in L(H)$$

das Integral von f bzgl. E .

8.18 Lemma. Sei E ein PV-Maß und seien f, g Stufenfunktionen.

- a) Die Abbildung $f \mapsto \int f dE$ ist linear.
- b) Für $x \in H$ gilt $\|(\int f dE)x\|^2 = \int |f|^2 dE_x \leq \|f\|_\infty^2 \|x\|^2$.
- c) Es gilt $(\int f dE)(\int g dE) = \int f g dE$.
- d) Es gilt $(\int f dE)^* = \int \bar{f} dE$.

Beweis. a) ist klar.

b) Unter Verwendung des Satzes von Pythagoras erhalten wir

$$\begin{aligned} \left\| \left(\int f dE \right) x \right\|^2 &= \left\| \sum_{i=1}^n f_i E(A_i) x \right\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n |f_i|^2 \|E(A_i) x\|^2 \\ &= \int |f|^2 dE_x \\ &\leq \|f\|_\infty^2 \|E_x\| = \|f\|_\infty^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

c) Mit Bemerkung 8.16 gilt

$$\begin{aligned} \left(\int f dE \right) \left(\int g dE \right) &= \left(\sum_{i=1}^n f_i E(A_i) \right) \left(\sum_{j=1}^m g_j E(B_j) \right) \\ &= \sum_{i,j} f_i g_j E(A_i) E(B_j) \\ &= \sum_{i,j} f_i g_j E(A_i \cap B_j) \\ &= \int f g dE. \end{aligned}$$

d) folgt direkt aus der Definition des Integrals. □

8.19 Definition. Sei E ein PV-Maß auf (X, \mathcal{A}) mit Werten in $L(H)$. Für $f \in B(X)$ sei $(f_n)_n \subset B(X)$ eine Folge von Stufenfunktionen, welche gleichmäßig gegen f konvergiert. Definiere das Integral

$$\int f dE := \int f(\lambda) dE(\lambda) := \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n dE \in L(H).$$

Für $A \in \mathcal{A}$ setzt man $\int_A f dE := \int \chi_A f dE$.

8.20 Bemerkung. a) Man beachte, dass das Integral wegen Lemma 8.18 b) wohldefiniert ist.

b) Die Eigenschaften von Lemma 8.18 übertragen sich in üblicher Weise auf messbare Funktionen.

c) Falls $K \in \mathcal{A}$ ist mit $E(K) = \text{id}_H$, so ist $\int f dE = \int_K f dE$ für alle $f \in B(X)$ (denn $E(X \setminus K) = 0$).

8.21 Satz. Sei $E: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow L(H)$ ein PV-Maß, und sei $K \subset \mathbb{R}$ kompakt mit $E(K) = \text{id}_H$.

a) Durch $T := \int \lambda dE(\lambda)$ wird ein selbstadjungierter Operator $T \in L(H)$ definiert.

b) Es gilt $E(\sigma(T)) = \text{id}_H$.

c) Die Abbildung $\Psi: B(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$, $f \mapsto \int_{\sigma(T)} f dE$ ist der (nach Satz 8.9 eindeutig bestimmte) messbare Funktionalkalkül zu T .

Beweis. a) ist klar nach Definition des Integrals und nach Lemma 8.18 d) (für messbare Funktionen).

b) Wähle ein Intervall $(a, b] \subset \mathbb{R}$ mit $K \subset (a, b]$, d.h. $E((a, b]) = \text{id}_H$.

(i) Wir zeigen zuerst: Zu $\mu \in \rho(T)$ existiert eine offene Umgebung U_μ von μ mit $E(U_\mu) = 0$. Dazu approximieren wir $\text{id}_{(a,b]}$ durch eine Treppenfunktion mit äquidistanten Stufen, $f = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{(a_{k-1}, a_k]}$, wobei $a_k := a + k\delta$ ($k = 0, \dots, N$) mit $\delta = \frac{b-a}{N}$. Damit ist

$$\left\| T - \int f dE \right\| \leq \| \text{id}_{(a,b]} - f \|_\infty \leq \delta.$$

Wegen $\int f dE = \sum_{k=1}^N a_k E((a_{k-1}, a_k])$ und $\sum_{k=1}^N E((a_{k-1}, a_k]) = \text{id}_H$ folgt

$$\left\| (\mu - T) - \sum_{k=1}^N (\mu - a_k) E((a_{k-1}, a_k]) \right\| \leq \delta.$$

Falls δ hinreichend klein ist (d.h. N hinreichend groß), so ist der Operator $S := \sum_{k=1}^N (\mu - a_k) E((a_{k-1}, a_k])$ invertierbar (da $\mu - T$ invertierbar ist), und für die Norm gilt $\|S^{-1}\| \leq 1 + \|(\mu - T)^{-1}\|$.

Es gilt aber auch $\|S^{-1}\| = \max\{\frac{1}{|\mu - a_k|} : E((a_{k-1}, a_k]) \neq 0\}$. Damit folgt $E((a_{k-1}, a_k]) = 0$ für alle k mit $|\mu - a_k| < \frac{1}{1 + \|(\mu - T)^{-1}\|}$, d.h. es ist $E(U_\mu) = 0$ für eine offene Umgebung U_μ von μ .

(ii) Falls $K \subset \rho(T)$ kompakt ist, ist $K \subset \bigcup_{\mu \in K} U_\mu$ eine offene Überdeckung mit $E(U_\mu) = 0$ für alle μ . Wegen Kompaktheit existiert eine endliche Teilüberdeckung $K \subset \sum_{i=1}^n U_{\mu_i}$, und $E(K) \leq \sum_{i=1}^n E(U_{\mu_i}) = 0$.

(iii) Schreibe $\rho(T)$ als abzählbare Vereinigung aufsteigender kompakter Mengen $(K_j)_{j \in \mathbb{N}}$. Dann folgt $E(\rho(T))x = \lim_{j \rightarrow \infty} E(K_j)x = 0$ für alle $x \in H$, d.h. $E(\rho(T)) = 0$ und damit $E(\sigma(T)) = \text{id}_H$.

c) Wir rechnen die Eigenschaften von Satz 8.9 nach. Dabei ist $\Psi(\text{id}_{\sigma(T)}) = T$ nach Definition von T , und $\Psi(\mathbf{1}_{\sigma(T)}) = \text{id}_H$ gilt nach b). Dass Ψ stetiger Homomorphismus von C^* -Algebren ist, ist klar nach Lemma 8.18 für messbare Funktionen.

Für die letzte Eigenschaft in Satz 8.9 benutzen wir das Maß $E_{x,y}$ aus Bemerkung 8.16 h). Es gilt

$$\left\langle \left(\int f dE \right) x, y \right\rangle = \int f dE_{x,y}.$$

Dies ist klar für Treppenfunktionen und folgt durch Approximation für messbare Funktionen. Nun folgt 8.9 (iii) aus dem Satz über majorisierte Konvergenz.

Damit erfüllt Ψ alle Eigenschaften aus Satz 8.9 und stimmt daher mit dem messbaren Funktionalkalkül überein. \square

8.22 Beispiel (Multiplikationsoperator). Sei $H = L_2([0, 1])$ und $T \in L(H)$ gegeben durch $(Tx)(t) := t \cdot x(t)$. Dann ist T selbstadjungiert mit $\sigma(T) = \sigma_c(T) = [0, 1]$.

Für $x, y \in L_2([0, 1])$ gilt

$$\langle Tx, y \rangle = \int_0^1 tx(t)\overline{y(t)} dt = \int_{\sigma(T)} \lambda dE_{x,y}(\lambda)$$

mit dem Maß $E_{x,y}(\lambda) = x(\lambda)\overline{y(\lambda)}d\lambda$. Das Maß $E_{x,y}$ besitzt also eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes. Für das Maß erhalten wir somit

$$E_{x,y}(A) = \int_{[0,1] \cap A} x(\lambda)\overline{y(\lambda)}d\lambda = \langle \chi_{[0,1] \cap A} \cdot x, y \rangle \quad (A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

d.h. $E(A)x = \chi_{[0,1] \cap A} \cdot x$. Die Projektion $E(A)$ ist damit gegeben als Multiplikationsoperator mit $\chi_{[0,1] \cap A}$.

8.23 Satz (Spektrum und Spektralmaß). Sei $T := \int \lambda dE(\lambda)$ wie in Satz 8.21.

a) Für $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ gilt $\lambda_0 \in \rho(T)$ genau dann, falls eine Umgebung $U \subset \mathbb{R}$ von λ_0 existiert mit $E(U) = 0$.

b) Es gilt $\lambda_0 \in \sigma_p(T)$ genau dann, wenn $E(\{\lambda_0\}) \neq 0$. Für alle $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ gilt $E(\{\lambda_0\}) = \ker(T - \lambda_0)$.

c) Es gilt $\lambda_0 \in \sigma_c(T)$ genau dann, wenn $E(\{\lambda_0\}) = 0$ und $E((\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon)) \neq 0$ für alle $\varepsilon > 0$ gilt.

Beweis. a) Wir wissen bereits, dass $E(\rho(T)) = 0$. Sei andererseits $U \subset \mathbb{R}$ eine (o.E. offene) Umgebung von λ_0 mit $E(U) = 0$. Definiere $f, g \in B(\sigma(T))$ durch $f(\lambda) := \frac{1}{\lambda - \lambda_0} \cdot \chi_{\sigma(T) \setminus U}$ und $g(\lambda) := (\lambda - \lambda_0)$. Dann gilt

$$f(T)(T - \lambda_0) = f(T)g(T) = (f \cdot g)(T) = \chi_{\sigma(T) \setminus U}(T) = E(\sigma(T) \setminus U) = \text{id}_H.$$

Wegen $f(T)g(T) = g(T)f(T)$ folgt $g(T)f(T) = \text{id}_H$, d.h. $f(T) = g(T)^{-1} = (T - \lambda_0)^{-1}$. Somit ist $\lambda_0 \in \rho(T)$.

b) Zu zeigen ist nur die letzte Gleichheit in b). Sei $x \in R(E(\{\lambda_0\}))$, d.h. $x = E(\{\lambda_0\})x$. Dann gilt

$$\langle (T - \lambda_0)x, y \rangle = \langle (T - \lambda_0)E(\{\lambda_0\})x, y \rangle = \int (\lambda - \lambda_0) \cdot \chi_{\{\lambda_0\}}(\lambda) d\langle E(\lambda)x, y \rangle = 0.$$

(Beachte, dass $(\lambda - \lambda_0)\chi_{\lambda_0}(\lambda) = 0$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt.) Damit ist $(T - \lambda_0)x = 0$, d.h. $x \in \ker(T - \lambda_0)$.

Falls andererseits $x \in \ker(T - \lambda_0)$, so folgt nach Satz 8.3 c) $f(T)x = f(\lambda_0)(x)$ für alle $f \in C(\sigma(T))$ und nach Lemma 8.10 für alle $f \in B(\sigma(T))$. Setzt man $f = \chi_{\{\lambda_0\}}$, so folgt $E(\{\lambda_0\})x = \chi_{\{\lambda_0\}}(T)x = \chi_{\{\lambda_0\}}(\lambda_0)x = x$, d.h. $x \in R(E(\{\lambda_0\}))$.

c) folgt aus a) und b) (beachte $\sigma_r(T) = \emptyset$). □

8.24 Satz (Spektralsatz für beschränkte selbstadjungierte Operatoren). Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert. Dann existiert ein eindeutig bestimmtes PV-Maß E mit kompaktem Träger auf \mathbb{R} mit $E(\sigma(T)) = \text{id}_H$ und

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda).$$

Die Abbildung $B(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$, $f \mapsto f(T) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda) dE(\lambda)$ definiert den messbaren Funktionalkalkül zu T . Für $f \in B(\sigma(T))$ und $x, y \in H$ gilt

$$\langle f(T)x, y \rangle = \int_{\sigma(T)} f(\lambda) dE_{x,y}(\lambda).$$

Beweis. (a) Definition des PV-Maßes: Sei $f \mapsto f(T)$ der messbare Funktionalkalkül nach Satz 8.9. Für $A \in \mathcal{B}(\sigma(T))$ definiere

$$E(A) := \chi_A(T).$$

(i) Wegen $\chi_A = \chi_A^2 = \bar{\chi}_A$ gilt $E(A) = E(A)^2 = E(A)^*$, d.h. $E(A)$ ist eine orthogonale Projektion.

(ii) Seien $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\sigma(T))$ paarweise disjunkt. Die Funktionen $f_n := \sum_{j=1}^n \chi_{A_j}$ konvergieren punktweise gleichmäßig beschränkt gegen $f := \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{A_j} = \chi_A$ mit $A := \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$. Nach Lemma 8.10 folgt

$$\sum_{j=1}^{\infty} E(A_j)x = \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{A_j}(T)x = \chi_A(T)x = E(A)x \quad (x \in H).$$

(iii) Nach Satz 8.9 gilt $E(\sigma(T)) = \mathbf{1}_{\sigma(T)}(T) = \text{id}_H$.

Nach (i)–(iii) ist $E: \mathcal{B}(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$ ein PV-Maß.

(b) Definiere den Operator $S := \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda)$ nach Satz 8.21. Sei $f \mapsto \Psi(f) := \int_{\sigma(T)} f dE$ der zugehörige messbare Funktionalkalkül nach Satz 8.21, und $f \mapsto f(T)$ der zu T gehörige Funktionalkalkül nach Satz 8.9. Zu zeigen ist $S = T$.

Wähle dazu eine Treppenfunktion f auf $\sigma(T)$ mit $\|f - \text{id}_{\sigma(T)}\|_{\infty} \leq \varepsilon$. Dann gilt

$$\|T - S\| \leq \|T - f(T)\| + \|f(T) - \Psi(f)\| + \|\Psi(f) - S\|.$$

Nach Satz 8.9 ist

$$\|T - f(T)\| \leq \|\text{id}_{\sigma(T)} - f\|_{\infty} \leq \varepsilon.$$

Ebenso ist nach Lemma 8.18 b)

$$\|S - \Psi(f)\| = \left\| \int_{\sigma(T)} (\lambda - f(\lambda)) dE(\lambda) \right\| \leq \|\text{id}_{\sigma(T)} - f\|_{\infty} \leq \varepsilon.$$

Schließlich ist

$$f(T) - \Psi(f) = \sum_{j=1}^n f_j \chi_{A_j}(T) - \sum_{j=1}^n f_j E(A_j) = 0.$$

Insgesamt erhalten wir

$$\|T - S\| \leq 2\varepsilon,$$

d.h. $T = S$. □

8.25 Lemma. Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert, E das zugehörige PV-Maß, und $S \in L(H)$. Dann sind äquivalent:

- (i) $ST = TS$,
- (ii) für alle $A \in \mathcal{B}(\sigma(T))$ gilt $SE(A) = E(A)S$,
- (iii) für alle $f \in B(\sigma(T))$ gilt $Sf(T) = f(T)S$.

Beweis. (i) \Rightarrow (ii). Aus $ST = TS$ folgt $ST^n = T^nS$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und damit

$$\langle ST^n x, y \rangle = \langle T^n Sx, y \rangle \quad (x, y \in H, n \geq 0). \quad (8-4)$$

Wir wissen bereits, dass E durch die Familie komplexer Maße $E_{x,y}$ mit $x, y \in H$ bestimmt ist. Wegen $\langle SE(A)x, y \rangle = \langle E(A)x, S^*y \rangle$ ist auch $\langle SE(A)x, y \rangle$ ein komplexes Maß. Nach dem Spektralsatz ist (8-4) äquivalent zu

$$\int \lambda^n d\langle SE(\lambda)x, y \rangle = \int \lambda^n d\langle E(\lambda)Sx, y \rangle \quad (x, y \in H, n \geq 0). \quad (8-5)$$

Damit stimmen die beiden Maße $\mu_{x,y}^{(1)}(A) := \langle SE(A)x, y \rangle$ und $\mu_{x,y}^{(2)}(A) := \langle E(A)Sx, y \rangle$ als Funktionale überein auf den Polynomen λ^n und damit auf den stetigen Funktionen $f \in C(\sigma(T))$ (Satz von Weierstraß). Nach dem Darstellungssatz von Riesz sind die Maße gleich. Damit ist (8-5) äquivalent zu

$$\langle SE(A)x, y \rangle = \langle E(A)Sx, y \rangle \quad (x, y \in H, A \in \mathcal{B}(\sigma(T))),$$

d.h. es gilt $SE(A) = E(A)S$ für alle $A \in \mathcal{B}(\sigma(T))$.

(ii) \Rightarrow (iii). Folgt aus $\langle Sf(T)x, y \rangle = \int f(\lambda) d\mu_{x,y}^{(1)}(\lambda)$ und $\langle f(T)Sx, y \rangle = \int f(\lambda) d\mu_{x,y}^{(2)}(\lambda)$.

(iii) \Rightarrow (i). Setze $f := \text{id}_{\sigma(T)}$. □

8.26 Beispiel. Sei $T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ eine selbstadjungierte Matrix mit den paarweise verschiedenen Eigenwerten μ_1, \dots, μ_m . Sei $E(\{\mu_j\})$ die Orthogonalprojektion auf den Eigenraum $\ker(\mu_j - T)$. Dann gilt

$$T = \sum_{j=1}^m \mu_j E(\{\mu_j\}) = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda),$$

wobei das PV-Maß zu T gegeben ist durch

$$E(A) = \sum_{j=1}^m E(A \cap \{\mu_j\}) = \sum_{\{j: \mu_j \in A\}} E(\{\mu_j\}) \quad (A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

8.27 Lemma. a) Seien $A, B \in L(H)$ mit $A \geq 0$, $B \geq 0$ und $AB = BA$. Dann ist $AB \geq 0$.

b) Sei $A \in L(H)$ mit $A \geq 0$. Dann existiert genau ein $B \in L(H)$ mit $B \geq 0$ und $B^2 = A$. Der Operator B heißt die Wurzel von A . Insbesondere existiert zu jedem Operator $A \in L(H)$ der Absolutbetrag $|A| := \sqrt{A^*A}$.

Beweis. a) Es gilt

$$AB = A\sqrt{B^2} = \sqrt{B}A\sqrt{B} \geq 0$$

wegen

$$\langle \sqrt{B}A\sqrt{B}x, x \rangle = \langle A\sqrt{B}x, \sqrt{B}x \rangle \geq 0 \quad (x \in H).$$

Hier wurde verwendet, dass A und \sqrt{B} vertauschen (Lemma 8.25).

b) Der Operator $B := \sqrt{A}$ erfüllt $B \geq 0$ und $B^2 = A$ nach dem Spektralsatz. Zu zeigen ist noch die Eindeutigkeit. Sei also $\tilde{B} \geq 0$ mit $\tilde{B}^2 = A$. Wähle $b \in \mathbb{R}$ mit $b > M := \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$ und $b > \|\tilde{B}\|^2$.

Zur Funktion $g(t) := \sqrt{t}$ existiert nach dem Satz von Weierstraß eine Folge $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Polynomen mit $\|p_n - g\|_\infty \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) im Intervall $[0, b] \supset [m, M]$. Damit gilt

$$\|p_n(A) - g(A)\| = \|p_n(A) - B\| \rightarrow 0 \quad \text{in } L(H). \quad (8-6)$$

Setze $\tilde{p}_n(t) := p_n(t^2)$ und $\tilde{g}(t) := g(t^2) (= t)$. Dann ist

$$\|\tilde{p}_n - \tilde{g}\|_\infty \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \text{ im Intervall } [0, \sqrt{b}] \supset [0, \|\tilde{B}\|].$$

Nach dem Funktionalkalkül gilt

$$\|\tilde{p}_n(\tilde{B}) - \tilde{g}(\tilde{B})\| = \|\tilde{p}_n(\tilde{B}) - \tilde{B}\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad (8-7)$$

Aber es ist $\tilde{p}_n(\tilde{B}) = p_n(\tilde{B}^2) = p_n(A)$. Somit folgt aus (8-6) und (8-7) die Gleichheit $\tilde{B} = g(A) = B$. \square

8.28 Bemerkung. Aus dem Spektralsatz folgen eine ganze Reihe von Aussagen über Spektrum bzw. Norm von Operatoren. So gilt zum Beispiel:

a) Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert und $\lambda_0 \in \rho(T)$. Dann gilt

$$\|(T - \lambda_0)^{-1}\| = [\text{dist}(\lambda_0, \sigma(T))]^{-1}.$$

Denn die rechte Seite ist $\|f\|_\infty$ für die Funktion $f \in C(\sigma(T))$ mit $f(\lambda) := \frac{1}{\lambda - \lambda_0}$. Vergleiche dazu Satz 7.4.

b) Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert und $f \in C(\sigma(T))$. Dann gilt $\|f(T)\| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\} = \|f\|_\infty$. Denn das Maximum ist der Spektralradius von T und $\|f(T)\| = \|f\|_\infty$ nach dem stetigen Funktionalkalkül. (Vergleiche Satz 7.11.) Insbesondere folgt aus der Darstellung $T = \int_K \lambda dE(\lambda)$ bereits $\|T\| \leq \max\{|\lambda| : \lambda \in K\}$.

8.29 Bemerkung. Der Spektralsatz wird häufig auch mit Hilfe von Spektralscharen formuliert. Dabei heißt eine Familie $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}} \subset L(H)$ eine Spektralschar, falls gilt:

(i) F_λ ist orthogonaler Projektor für alle $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (ii) $F_\mu F_\lambda = F_\lambda F_\mu = F_\mu$ für alle $\mu \leq \lambda$.
- (iii) $F_\mu x \rightarrow F_\lambda x$ für $\mu \searrow \lambda$ ($x \in H$) (Rechtsstetigkeit).
- (iv) $F_\lambda x \rightarrow 0$ für $\lambda \rightarrow -\infty$ ($x \in H$).
- (v) $F_\lambda x \rightarrow x$ für $\lambda \rightarrow +\infty$ ($x \in H$).

Sei $T \in L(H)$ selbstadjungiert und E das zugehörige PV-Maß. Dann wird durch

$$F_\lambda := E((-\infty, \lambda]) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

eine Spektralschar definiert. Definiert man das Integral über Spektralscharen geeignet (etwa im Sinne eines Riemann-Stieltjes-Integrals), so gilt

$$T = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda dF_\lambda.$$

Die Spektralscharen entsprechen den Verteilungsfunktionen in der Wahrscheinlichkeitstheorie, die Darstellung von T durch Spektralscharen ist äquivalent zur Darstellung durch PV-Maße.

Der Spektralsatz wurde oben für beschränkte selbstadjungierte Operatoren formuliert. Tatsächlich gilt dieser Satz aber für allgemeinere Operatoren: Zum einen kann die Selbstadjungiertheit $T = T^*$ durch die Normalität des Operators $TT^* = T^*T$ ersetzt werden, zum anderen kann T auch unbeschränkt sein. Man beachte, dass zwei unbeschränkte Operatoren genau dann gleich sind, wenn sie gleichen Definitionsbereich besitzen und auf diesem übereinstimmen. Der folgende Satz wird hier nicht bewiesen, der wesentliche Teil des Beweises wurde aber oben schon durchgeführt.

8.30 Definition und Satz (Integral über PV-Maß für messbare Funktionen). Sei (X, \mathcal{A}) ein Messraum, $E: \mathcal{A} \rightarrow L(H)$ ein PV-Maß. Zu $x \in H$ sei wieder $E_x: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$ durch $E_x(A) := \|E(A)x\|^2$ definiert. Sei $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ messbar.

Definiere

$$D\left(\int f dE\right) := \left\{x \in H : \int |f|^2 dE_x < \infty\right\}.$$

Dann existiert für alle $x \in D(\int f dE)$ eine Folge von Stufenfunktionen $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f_n \rightarrow f$ punktweise und $\int |f_n - f|^2 dE_x \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), und der Operator

$$\int f dE: H \supset D\left(\int f dE\right) \rightarrow H, \quad x \mapsto \left(\int f dE\right)x := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int f_n dE\right)x$$

ist wohldefiniert.

8.31 Satz (Spektralsatz, allgemeine Formulierung). Sei H ein \mathbb{C} -Hilbertraum und $T: H \supset D(T) \rightarrow H$ ein normaler Operator in H . Dann existiert genau ein PV-Maß

$E: \mathcal{B}(\sigma(T)) \rightarrow L(H)$ mit

$$T = \int_{\sigma(T)} \text{id}_{\sigma(T)} dE.$$

Für jede messbare Funktion $f: \sigma(T) \rightarrow \mathbb{C}$ wird durch

$$f(T) := \int_{\sigma(T)} f dE, \quad D(f(T)) := \left\{ x \in H : \int_{\sigma(T)} |f|^2 dE_x < \infty \right\}$$

ein normaler Operator definiert. Es gelten die üblichen Regeln für den Funktionalkalkül. Falls f ein Polynom ist, stimmt $f(T)$ mit der üblichen Definition überein.

9. Eigenschaften der L^p -Räume

Die L^p -Räume (als Äquivalenzklassen) sind uns bereits bekannt. Es handelt sich um normierte Räume. In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass die L^p -Räume vollständig und damit Banachräume sind. Bemerkenswert an dieser Aussage ist auch, dass keine Bedingungen an den zugrunde liegenden Maßraum gestellt wird und dass die Aussage für alle $1 \leq p \leq \infty$ gilt. Besonders wichtig ist der Fall $p = 2$: Hier hat man sogar einen Hilbertraum. Die L^2 -Räume sind die Grundlage für viele weitergehende Untersuchungen der Analysis und der Physik. Z.B. ist $L^2(\mathbb{R}^n)$ einer der fundamentalen Räume der Quantenmechanik.

Die Testfunktionen (d.h. die unendlich oft differenzierbaren Funktionen mit kompaktem Träger) liegen dicht in L^p für alle p mit $1 \leq p < \infty$. Diese Aussage ist wichtig, da sie es erlaubt, sich bei Abschätzungen in L^p -Normen auf Testfunktionen zu beschränken. Der Beweis der Dichtheit der Testfunktionen wird unter Verwendung der Faltung geführt. Die Faltung einer recht allgemeinen Funktion mit einer glatten Funktion ergibt wieder eine glatte Funktion; man spricht auch vom Friedrichschen Glättungsoperator.

Die Faltung hat aber auch selbst eine wichtige Bedeutung: Betrachtet man etwa recht allgemeine lineare und zeitinvariante Übertragungssysteme, so kann die Ausgabe als Faltung beschrieben werden. Dieser Zugang ist etwa wichtig in der Signaltheorie; so wird etwa der Kanal eines Rundfunk- oder Fernsehsystems mit Hilfe der Faltung beschrieben.

a) Die Faltung

Im folgenden beziehen sich die Begriffe wie Messbarkeit und Integrierbarkeit stets auf das Lebesgue-Maß. Dabei heißt messbar zunächst Borel-messbar, falls nötig, verwenden wir auch die Vervollständigung des Lebesgue-Maßes, also Lebesgue-messbare Mengen.

9.1 Definition. Seien $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ messbar. Definiere

$$N_{f,g} := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \int |f(y)| \cdot |g(x-y)| dy = \infty \right\}$$

und das Faltungsprodukt $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ durch

$$(f * g)(x) := \begin{cases} \int f(y)g(x-y)dy, & x \notin N_{f,g}, \\ 0, & x \in N_{f,g}. \end{cases}$$

9.2 Lemma. Seien $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ messbar.

- a) Es ist $f * g = g * f$, d.h. die Faltung ist kommutativ.
 b) Es gilt $\{f * g \neq 0\} \subset \{f \neq 0\} + \{g \neq 0\} = \{y_1 + y_2 : f(y_1) \neq 0, g(y_2) \neq 0\}$.
 c) Falls $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, so ist $\lambda(N_{f,g}) = 0$ und $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ mit

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.$$

- d) Sei $1 \leq p, q \leq \infty$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Für $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ und $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ ist dann $\lambda(N_{f,g}) = 0$ und $f * g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ mit

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

- e) Falls $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$, so ist $(f * g) * h = f * (g * h)$, d.h. die Faltung ist assoziativ.

Beweis. a) folgt sofort aus dem Transformationssatz mit der Transformation $y \mapsto x - y$, einmal angewendet auf den Integranden $|f(\cdot)g(x - \cdot)|$ und einmal auf den Integranden $f(\cdot)g(x - \cdot)$.

- b) Falls $x \notin \{f \neq 0\} + \{g \neq 0\}$ und $y \in \mathbb{R}^n$ beliebig, so ist $f(y)g(x - y) = 0$ wegen $x = y + (x - y)$. Also ist $(f * g)(x) = 0$.

- c) Nach dem Satz von Fubini und mit der Translationsinvarianz des Lebesgue-Integrals gilt

$$\int \left(\int |f(y)| \cdot |g(x - y)| dy \right) dx = \int |f(y)| dy \int |g(x - y)| dx = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1.$$

Damit folgt $\lambda(N_{f,g}) = 0$ und

$$\begin{aligned} \|f * g\|_1 &= \int \left| \int f(y)g(x - y) dy \right| dx \\ &\leq \int \left(\int |f(y)| \cdot |g(x - y)| dy \right) dx = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1. \end{aligned}$$

- d) Nach der Hölderschen Ungleichung gilt für jedes $x \in \mathbb{R}^n$

$$|(f * g)(x)| \leq \int |f(y)| \cdot |g(x - y)| dy = \| |f(\cdot)g(x - \cdot)| \|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q,$$

wobei wieder die Translationsinvarianz des Lebesgue-Maßes verwendet wurde.

- e) folgt mit Fubini. □

9.3 Lemma. a) Sei $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ und $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ mit $\text{supp } g$ kompakt. Dann ist auch $f * g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

b) Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $g \in C_b(\mathbb{R}^n)$, dann ist $f * g$ stetig. Das Gleiche gilt, falls $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ und $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$.

Beweis. a) Sei $K \subset \mathbb{R}^n$ kompakt und $L := K - \text{supp } g$. Als stetiges Bild der kompakten Menge $K \times \text{supp } g$ unter der Abbildung $\delta: (x, y) \mapsto x - y$ ist L wieder kompakt. Für $x \in K$ und $y \in \mathbb{R}^n$ ist $f(x - y)g(y) = (f \cdot \chi_L)(x - y)g(y)$. Wegen $f \cdot \chi_L \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ist

$$\chi_K \cdot (f * g) = \chi_K \cdot [(f \cdot \chi_L) * g] \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

b) folgt aus dem Satz über parameterabhängige Integrale. □

9.4 Satz. Sei $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ und $g \in C^k_c(\mathbb{R}^n)$. Dann ist $f * g \in C^k(\mathbb{R}^n)$, und es gilt

$$D^\alpha(f * g) = f * (D^\alpha g) \quad (|\alpha| \leq k).$$

Insbesondere ist $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, falls $g \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

Beweis. Nach Lemma 9.3 ist $f * g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Da die Differenzierbarkeit eine lokale Aussage ist, kann man $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ annehmen. Dann folgt die Aussage aus dem Satz über parameterabhängige Integrale, da $D^\alpha g$ als stetige Funktion mit kompaktem Träger beschränkt ist. □

b) Vollständigkeits- und Dichtheitsaussagen

9.5 Satz. Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum und $1 \leq p \leq \infty$. Dann ist $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ ein Banachraum. Speziell ist $L^2(\mu)$ ein Hilbertraum mit Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle_2 := \int f \bar{g} \, d\mu \quad (f, g \in L^2(\mu)).$$

Beweis. Die Eigenschaften einer Norm bzw. des Skalarprodukts folgen durch direktes Nachrechnen und die Minkowski-Ungleichung, es ist also nur noch die Vollständigkeit zu zeigen. Wir beschränken uns auf $p < \infty$.

Sei $1 \leq p < \infty$ und $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset L^p(\mu)$ eine Cauchyfolge. Wähle eine Teilfolge $(f_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ mit $\|f_{k_j} - f_{k_{j+1}}\|_p \leq 2^{-j}$ und definiere

$$g_\ell := \sum_{j=1}^{\ell} |f_{k_j} - f_{k_{j+1}}|, \quad g := \sum_{j=1}^{\infty} |f_{k_j} - f_{k_{j+1}}|.$$

Aus der Minkowskischen Ungleichung folgt $\|g_\ell\|_p \leq 1$, und nach dem Satz von der monotonen Konvergenz gilt

$$\|g\|_p^p = \int |g|^p \, d\mu = \int \lim_{\ell \rightarrow \infty} |g_\ell|^p \, d\mu = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int |g_\ell|^p \, d\mu \leq 1.$$

Damit ist g μ -fast überall endlich und damit ist die Reihe

$$f(x) := f_{k,1}(x) + \sum_{j=1}^{\infty} (f_{k,j}(x) - f_{k,j+1}(x))$$

für μ -fast alle $x \in X$ absolut konvergent. Somit gilt $f = \lim_{j \rightarrow \infty} f_{k,j}$ μ -fast überall. Setze noch $f = 0$, falls die obige Reihe nicht absolut konvergent ist, so ist f messbar als punktwiser Grenzwert messbarer Funktionen.

Wir zeigen $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$). Zu $\varepsilon > 0$ wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $\|f_k - f_\ell\|_p < \varepsilon$ für alle $k, \ell \geq N$. Nach dem Lemma von Fatou ist

$$\int |f - f_k|^p d\mu = \int \lim_{j \rightarrow \infty} |f_{k,j} - f_k|^p d\mu \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int |f_{k,j} - f_k|^p d\mu \leq \varepsilon^p.$$

Insbesondere ist $f - f_k \in L^p(\mu)$ und damit $f = f_k + (f - f_k) \in L^p(\mu)$, und $f_k \rightarrow f$ in $L^p(\mu)$. \square

9.6 Korollar. Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Maßraum, $1 \leq p \leq \infty$ und $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p(\mu)$ eine Folge mit $f_n \rightarrow f \in L^p(\mu)$ ($n \rightarrow \infty$). Dann besitzt $(f_n)_n$ eine Teilfolge, welche μ -fast überall gegen f konvergiert.

Beweis. Das wurde im Beweis von Satz 9.5 mit gezeigt. \square

Der folgende Satz aus der Maßtheorie wird hier nicht bewiesen.

9.7 Satz (von Lusin). Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen mit $\lambda(U) < \infty$ und $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ messbar. Zu $\varepsilon > 0$ existiert eine kompakte Menge $K \subset U$ mit $\lambda(U \setminus K) < \varepsilon$, so dass $f|_K$ stetig ist.

9.8 Satz. Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, $1 \leq p < \infty$. Dann ist $C_c(U)$ dicht in $L_p(U)$.

Beweis. O.E. sei $f \in L^p(U; \mathbb{R})$ mit $f \geq 0$ (sonst verwende man eine Zerlegung). Sei $\varepsilon > 0$.

Wegen

$$U = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} U_k \quad \text{mit } U_k := \left\{ x \in U : |x| < k, \text{dist}(x, \partial U) > \frac{1}{k} \right\}$$

gilt $\int_U |f - f \cdot \chi_{U_k}|^p d\lambda \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$). Wähle ein $k \in \mathbb{N}$ mit $\|f - f_k\|_p < \frac{\varepsilon}{4}$ für $f_k := f \cdot \chi_{U_k}$.

Zu f_k existiert eine Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Stufenfunktionen mit $s_n \nearrow f_k$ punktweise. Wegen $0 \leq s_n \leq f_k$ ist $s_n \in L_p(U)$. Wegen $(f_k - s_n)^p \leq f_k^p$ folgt mit majorisierter Konvergenz $s_n \rightarrow f_k$ in $L_p(U)$. Wähle ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_k - s_{n_0}\|_p < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Da $\lambda(U_k) < \infty$, existiert nach dem Satz von Lusin 9.7 eine kompakte Menge $K \subset U_k$ mit $s_{n_0}|_K$ stetig und

$$\lambda(U_k \setminus K) < \left(\frac{\varepsilon}{4\|s_{n_0}\|_\infty}\right)^p.$$

Setze nun

$$\tilde{\varphi}(x) := \begin{cases} s_{n_0}(x), & x \in K, \\ 0, & x \in U \setminus U_k. \end{cases}$$

Da K und $U \setminus U_k$ disjunkt und beide abgeschlossen (in der Relativtopologie von U) sind, existiert nach dem Erweiterungslemma von Tietze (Satz 1.5) eine Fortsetzung $\varphi \in C(U)$ mit $|\varphi(x)| \leq \|s_{n_0}\|_\infty$ ($x \in U$). Wegen $\varphi = 0$ auf $U \setminus U_k$ ist $\text{supp } \varphi \subset \overline{U_k} \subset U$, d.h. $\varphi \in C_c(U)$.

Es gilt

$$\begin{aligned} \|s_{n_0} - \varphi\|_p^p &= \int_U |s_{n_0} - \varphi|^p d\lambda = \int_{U_k \setminus K} |s_{n_0} - \varphi|^p d\lambda \\ &\leq 2^p \|s_{n_0}\|_\infty^p \lambda(U_k \setminus K) < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p. \end{aligned}$$

Damit ist $\|f - \varphi\|_p \leq \|f - f_k\|_p + \|f_k - s_{n_0}\|_p + \|s_{n_0} - \varphi\|_p < \varepsilon$. □

9.9 Satz. Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen. Dann liegt $\mathcal{D}(U)$ dicht in $L^p(U)$ für alle $1 \leq p < \infty$.

Beweis. Der Beweis wird unter Verwendung des Friedrichschen Glättungsoperators geführt. Seien $f \in L^p(U)$ und $\varepsilon > 0$.

Nach Satz 9.8 existiert ein $g \in C_c(U)$ mit $\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$.

Wähle $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ mit $\varphi \geq 0$, $\int \varphi(x) dx = 1$ und $\text{supp } \varphi \subset \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$. Setze dann $\varphi_\eta(x) := \eta^{-n} \varphi(\frac{x}{\eta})$ für $\eta > 0$. Dann gilt $\text{supp } \varphi_\eta \subset \{|x| \leq \eta\}$.

Nach Satz 9.4 gilt $g * \varphi_\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Nach Lemma 9.2 b) ist für hinreichend kleine η die Menge

$$K := \text{supp } g \cup \text{supp}(g * \varphi_\eta) \subset U$$

kompakt, d.h. $g * \varphi_\eta \in \mathcal{D}(U)$.

Für $x \in K$ gilt

$$|g * \varphi_\eta(x) - g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\eta(x - y)(g(x) - g(y)) dy \right|$$

$$\begin{aligned} &\leq \left(\sup_{|x-y|\leq\eta} |g(x) - g(y)| \right) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\eta(x-y) dy \\ &= \sup_{|x-y|\leq\eta} |g(x) - g(y)|. \end{aligned}$$

Da K kompakt und $g \in C(K)$, ist g auf K gleichmäßig stetig. Damit existiert ein $\eta > 0$ mit

$$\sup_{|x-y|\leq\eta} |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{\lambda(K)} \right)^{1/p}.$$

Damit folgt

$$\int_U |g * \varphi_\eta(x) - g(x)|^p dx \leq \lambda(K) \sup_{x \in K} |g * \varphi_\eta(x) - g(x)|^p < \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p.$$

Damit erhalten wir $\|f - (g * \varphi_\eta)\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - (g * \varphi_\eta)\|_p < \varepsilon$. □

10. Die Fourier-Transformation

10.1 Worum geht's? Die Fourier-Transformation beschreibt mathematisch die Zerlegung einer Funktion oder eines akustischen oder elektromagnetischen Signals in Grundschwingungen. Innerhalb der Mathematik tritt die Fourier-Transformation insbesondere im Rahmen der partiellen Differentialgleichungen auf. Dies liegt daran, dass die Ableitung in der Fourier-Transformierten zur Multiplikation mit der Koordinatenfunktion wird.

Die Fourier-Transformierte ist zunächst für Funktionen in $L^1(\mathbb{R}^n)$ definiert. Schränkt man die Fourier-Transformation auf den Schwartz-Raum $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ein, so erhalten wir eine Isometrie bzgl. $\|\cdot\|_2$ -Norm. Damit können wir die Fourier-Transformation auch auf $L^2(\mathbb{R}^n)$ definieren, was für Anwendungen wichtig ist, da es sich bei $L^2(\mathbb{R}^n)$ um einen Hilbertraum handelt.

Im folgenden wird die Multiindex-Schreibweise aus Definition 5.2 verwendet, wobei zusätzlich

$$D^\alpha := (-i)^{|\alpha|} \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1} \dots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n}$$

gesetzt wird.

10.2 Definition. Für $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ heißt $\mathcal{F}f$, definiert durch

$$(\mathcal{F}f)(\xi) := \hat{f}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix\xi} dx \quad (\xi \in \mathbb{R}^n),$$

die Fourier-Transformierte von f .

10.3 Lemma (Elementare Eigenschaften). Seien $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\alpha > 0$ und $a \in \mathbb{R}^n$.

- Für $g(x) := f(x)e^{iax}$ gilt $\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi - a)$.
- Für $g(x) := f(x - a)$ gilt $\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi)e^{-ia\xi}$.
- Für $g(x) := \overline{f(-x)}$ gilt $\hat{g}(\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$.
- Für $g(x) := f\left(\frac{x}{\alpha}\right)$ gilt $\hat{g}(\xi) = \alpha^n \hat{f}(\alpha\xi)$.
- Sei $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $h := f * g$. Dann gilt $\hat{h}(\xi) = (2\pi)^{n/2} \hat{f}(\xi) \cdot \hat{g}(\xi)$.

Beweis. Die Aussagen a)-c) folgen unmittelbar aus der Definition, Teil d) folgt aus dem Transformationsatz. Für e) verwende man den Satz von Fubini und erhalte

$$\begin{aligned} \hat{h}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \int \left[\int f(x-y)g(y)dy \right] e^{-ix\xi} dx \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int \left[\int f(x-y)g(y)dy \right] e^{-i(x-y)\xi} e^{-iy\xi} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (2\pi)^{n/2} \cdot (2\pi)^{-n/2} \int g(y) \left[(2\pi)^{-n/2} \int f(z) e^{-iz\xi} dz \right] e^{-iy\xi} dy \\
&= (2\pi)^{n/2} \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi).
\end{aligned}$$

□

10.4 Satz. Für $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ist $\mathcal{F}f \in C_0(\mathbb{R}^n)$. Die Fourier-Transformation $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow (C_0(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$ ist ein stetiger linearer Operator mit Norm $\|\mathcal{F}\| \leq (2\pi)^{-n/2}$.

Beweis. Offensichtlich ist $\mathcal{F}f$ messbar mit $\|\mathcal{F}f\|_\infty \leq (2\pi)^{-n/2} \|f\|_1$, d.h. $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ ist stetig mit Norm nicht größer als $(2\pi)^{-n/2}$.

(i) Wir zeigen, dass $\mathcal{F}f$ stetig ist. Sei dazu $(\xi^{(k)})_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ mit $\xi^{(k)} \rightarrow \xi$. Dann gilt $e^{-ix\xi^{(k)}} \rightarrow e^{-ix\xi}$ ($x \in \mathbb{R}^n$) und

$$|\mathcal{F}f(\xi^{(k)}) - \mathcal{F}f(\xi)| \leq (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \cdot \underbrace{|e^{-ix\xi^{(k)}} - e^{-ix\xi}|}_{\leq 2} dx \rightarrow 0$$

mit majorisierter Konvergenz.

(ii) Es gilt $\mathcal{F}f(\xi) \rightarrow 0$ für $|\xi| \rightarrow \infty$. Dazu verwenden wir, dass nach Satz 9.9 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ dicht in $L^1(\mathbb{R}^n)$ ist. Da $\mathcal{F} : L^1 \rightarrow L^\infty$ stetig ist, reicht es, $\mathcal{F}f(\xi) \rightarrow 0$ für $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ zu zeigen.

Sei $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $R > 0$ und $\xi \in \mathbb{R}^n$ mit $|\xi| \geq R$. Wähle j mit $|\xi_j| \geq \frac{R}{\sqrt{n}}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
|\mathcal{F}f(\xi)| &= \left| \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix\xi} dx \right| \\
&= \left| -\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{x_j} f(x) \frac{1}{-i\xi_j} e^{-ix\xi} dx \right| \\
&\leq (2\pi)^{-n/2} \|\partial_{x_j} f\|_1 \cdot \frac{\sqrt{n}}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).
\end{aligned}$$

□

10.5 Definition. Der Schwartzraum $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ wird definiert als die Menge aller $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, für welche für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n$ gilt:

$$p_{\alpha,\beta}(f) := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta f(x)| < \infty.$$

Versehen mit der Familie $L = \{p_{\alpha,\beta} : \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n\}$ wird $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ein lokalkonvexer topologischer Raum (siehe Definition 2.16), der sogar Fréchetraum, d.h. metrisierbar und vollständig ist.

10.6 Bemerkung. a) Definiere die Familie $\tilde{L} := \{p_N : N \in \mathbb{N}\}$ von Normen auf $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ durch

$$p_N(f) := \sup\{(1 + |x|)^N |D^\alpha f(x)| : |\alpha| \leq N, x \in \mathbb{R}^n\} \quad (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)).$$

Dann wird durch \tilde{L} dieselbe lokalkonvexe Topologie auf $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ erzeugt. Im folgenden wird $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ stets mit dieser lokalkonvexen Topologie versehen.

Man beachte, dass für eine Folge $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ und für $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ gilt

$$f_k \rightarrow f \quad (k \rightarrow \infty) \text{ in } \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \iff \forall N \in \mathbb{N} : p_N(f - f_k) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

b) Der Schwartzraum $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ liegt dicht in $L^p(\mathbb{R}^n)$ für alle $1 \leq p < \infty$. Denn jedes $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ liegt in $L^p(\mathbb{R}^n)$ wegen

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} c(1 + |x|)^{-mp} dx < \infty$$

für $mp > n$. Die Dichtheit von $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ ist klar wegen $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

c) Analog zur Definition von Distributionen $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ wird auch der Dualraum von $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ betrachtet. Man definiert

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) := \{T : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{C} : T \text{ linear, stetig}\}.$$

Man beachte, dass dabei auf $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ die obige lokalkonvexe Topologie gewählt wird. Der Raum $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ heißt der Raum der temperierten Distributionen.

10.7 Lemma. Für $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ und $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ gilt:

(i) $\mathcal{F}f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ und $D^\alpha(\mathcal{F}f) = (-1)^{|\alpha|} \mathcal{F}(x^\alpha f)$.

(ii) $\mathcal{F}(D^\alpha f)(\xi) = \xi^\alpha (\mathcal{F}f)(\xi) \quad (\xi \in \mathbb{R}^n)$.

(iii) $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

Beweis. (i) Da $x \mapsto x^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ eine integrierbare Majorante der Ableitung des Integranden ist, folgt aus dem Satz über parameterabhängige Integrale

$$\begin{aligned} D^\alpha(\mathcal{F}f)(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) D_\xi^\alpha e^{-ix\xi} d\xi \\ &= \frac{(-i)^{2|\alpha|}}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) x^\alpha e^{-ix\xi} d\xi = (-1)^{|\alpha|} (\mathcal{F}(x^\alpha f))(\xi). \end{aligned}$$

(ii) Mit partieller Integration erhalten wir

$$\mathcal{F}(D^\alpha f)(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} (D^\alpha f)(x) e^{-ix\xi} dx$$

$$= \frac{(-1)^{|\alpha|}}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) D_x^\alpha e^{-ix\xi} dx = \xi^\alpha \mathcal{F} f(\xi).$$

(iii) Nach (i) gilt $\mathcal{F} f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Außerdem gilt

$$x^\alpha D^\beta (\mathcal{F} f)(\xi) = (-1)^{|\beta|} \mathcal{F} \left(\underbrace{D^\alpha x^\beta f}_{\in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \right)(\xi) \rightarrow 0 \quad (|\xi| \rightarrow \infty),$$

wobei wir Satz 10.4 verwendet haben. □

10.8 Lemma. Für $\gamma(x) := \exp(-\frac{|x|^2}{2})$ gilt $\mathcal{F} \gamma = \gamma$.

Beweis. (i) Sei $n = 1$. Die Funktion γ ist die eindeutige Lösung des Anfangswertproblems

$$y' + xy = 0, \quad y(0) = 1. \quad (10-1)$$

Damit gilt

$$0 = \mathcal{F}(\gamma' + x\gamma) = i\xi(\mathcal{F}\gamma) + i(\mathcal{F}\gamma)'$$

Wegen

$$(\mathcal{F}\gamma)(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

löst $\mathcal{F}\gamma$ ebenfalls das Anfangswertproblem (10-1). Also gilt $\gamma = \mathcal{F}\gamma$.

(ii) Für $n > 1$ schreiben wir

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}\gamma)(\xi) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\prod_{j=1}^n e^{-x_j^2/2} \cdot \prod_{j=1}^n e^{-ix_j \xi_j} \right) dx \\ &= \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-x_j^2/2} e^{-ix_j \xi_j} dx_j \right) \\ &= \prod_{j=1}^n e^{-\xi_j^2/2} = \gamma(\xi). \end{aligned}$$

□

10.9 Lemma. a) Für $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ gilt

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \mathcal{F} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F} f(x) g(x) dx,$$

d.h. $\langle f, \overline{\mathcal{F}g} \rangle_2 = \langle \mathcal{F}f, \bar{g} \rangle_2$.

b) Für $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ gilt $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ ($x \in \mathbb{R}^n$).

Beweis. a) folgt sofort aus dem Satz von Fubini, da $(x, y) \mapsto f(x)g(y)e^{-ixy} \in L^1(\mathbb{R}^{2n})$.

b) Sei $\gamma_a(x) := \gamma(ax)$ für $a > 0$ mit γ wie in Lemma 10.8. Nach Lemma 10.3 gilt

$$(\mathcal{F}\gamma_a)(\xi) = a^{-n}(\mathcal{F}\gamma)\left(\frac{\xi}{a}\right).$$

Sei $g(x) := e^{-ix\xi_0}\gamma_a(x)$ für $\xi_0 \in \mathbb{R}^n$ fest und $a > 0$ fest. Dann ist $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ und

$$(\mathcal{F}g)(\xi) = (\mathcal{F}\gamma_a)(\xi + \xi_0) = a^{-n}\gamma\left(\frac{\xi + \xi_0}{a}\right).$$

Unter Verwendung von a) erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} (\mathcal{F}f)(x)g(x)dx &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)(\mathcal{F}g)(x)dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)a^{-n}(\mathcal{F}\gamma)\left(\frac{x + \xi_0}{a}\right)dx \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(au - \xi_0)\gamma(u)du. \end{aligned} \quad (10-2)$$

Bei der letzten Gleichheit haben wir die Substitution $u = \frac{x + \xi_0}{a}$ und die Identität $\mathcal{F}\gamma = \gamma$ verwendet.

Wir nehmen den Grenzwert $a \rightarrow 0$. Es gilt dann $\gamma(au) \rightarrow 1$ punktweise und $g(x) \rightarrow e^{-ix\xi_0}$ punktweise. Wegen $\mathcal{F}f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ können wir majorisierte Konvergenz anwenden und erhalten

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} (\mathcal{F}f)(x)g(x)dx \rightarrow (\mathcal{F}^2f)(\xi_0).$$

Um den Grenzwert für die rechte Seite von (10-2) zu berechnen, verwenden wir $f(au - \xi_0) \rightarrow f(-\xi_0)$ punktweise. Da $\|f\|_\infty \cdot \gamma$ eine integrierbare Majorante ist, erhalten wir

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(au - \xi_0)\gamma(u)du \rightarrow f(-\xi_0).$$

Also gilt $(\mathcal{F}^2f)(\xi_0) = f(-\xi_0)$. □

10.10 Definition und Satz. a) Die Fourier-Transformation $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ist eine Bijektion mit

$$(\mathcal{F}^{-1}g)(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi)e^{ix\xi}d\xi.$$

b) (Satz von Plancherel.) Es gilt

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\mathcal{F}f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)).$$

Somit ist $\mathcal{F}|_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)}$ eine Isometrie und damit eindeutig zu einem isometrischen Isomorphismus $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ fortsetzbar, der ebenfalls Fourier-Transformation genannt wird. Insbesondere gilt

$$\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = \|f\|_2 \quad (f \in L^2(\mathbb{R}^n)).$$

Beweis. a) Nach Lemma 10.9 gilt $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$, d.h. $\mathcal{F}^4 = \text{id}_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)}$. Damit gilt

$$(\mathcal{F}^{-1}g)(x) = (\mathcal{F}^3g)(x) = (\mathcal{F}g)(-x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) e^{ix\xi} d\xi.$$

b) Im Beweis von Lemma 10.9 sahen wir

$$\langle \mathcal{F}f, \bar{g} \rangle_{L_2(\mathbb{R}^n)} = \langle f, \overline{\mathcal{F}g} \rangle_{L_2(\mathbb{R}^n)}.$$

Setze nun $g := \mathcal{F}^{-1}\bar{g}$, d.h.

$$\bar{g} = \overline{\mathcal{F}^{-1}\bar{g}} = (2\pi)^{-n/2} \int \overline{f(x) e^{ix\xi}} dx = \mathcal{F}f.$$

Damit folgt $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$.

Da $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L_2(\mathbb{R}^n)$ dicht ist, ist die Fortsetzung $\mathcal{F}_2 : L_2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L_2(\mathbb{R}^n)$ wohldefiniert und ebenfalls isometrisch. Zu zeigen ist noch, dass \mathcal{F}_2 surjektiv ist. Nach Lemma 7.3 ist $R(\mathcal{F}_2)$ abgeschlossen. Wegen $R(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_2(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)) = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ist $R(\mathcal{F}_2)$ dicht in $L^2(\mathbb{R}^n)$ und damit \mathcal{F}_2 surjektiv. \square

10.11 Definition und Satz. Für $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ definiere $\mathcal{F}T(\varphi) := T(\mathcal{F}\varphi)$ ($\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$). Dann ist $\mathcal{F} : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ linear, stetig und bijektiv mit stetigem Inversen.

Literatur

- [1] Adams, R. A.: Sobolev spaces. Academic Press, New York 1975.
- [2] Diestel, J., Uhl, J. J.: Vector measures. Amer. Math. Soc., Providence, 1977.
- [3] Dunford, N., Schwartz, J. T.: Linear Operators. I. General Theory. Interscience Publishers, New York 1963.
- [4] Gohberg, I., Goldberg, S.: Basic operator theory. Birkhäuser Boston 1981.
- [5] Gohberg, I., Goldberg, S., Kaashoek, M. A.: Classes of linear operators. Vol. I. Birkhäuser Basel 1990.
- [6] Halmos, P.: A Hilbert Space Problem Book. Springer-Verlag, Berlin 1974.
- [7] Heuser, H.: Funktionalanalysis. B.G. Teubner Verlag, Stuttgart 1986.
- [8] Hirzebruch, F., Scharlau, W.: Einführung in die Funktionalanalysis. Bibliogr. Inst. Mannheim 1971.
- [9] Kato, T.: Perturbation theory for linear operators. Springer Berlin 1976.
- [10] Pazy, A.: Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations. Springer, Berlin et al. 1983.
- [11] Reed, M., Simon, B.: Methods of modern mathematical physics. I. Functional analysis. Academic Press San Diego 1980.
- [12] Rudin, W.: Functional analysis. McGraw-Hill New York 1973.
- [13] Rudin, W.: Real and complex analysis. McGraw-Hill New York 1986.
- [14] Werner, D.: Funktionalanalysis (5., erw. Aufl.). Springer Berlin 2005.
- [15] Yosida, K.: Functional Analysis. Springer-Verlag, Berlin et al. 1965.

Index

- ε -Netz, 7
- Abbildung
 - offene, 1
 - stetige, 1
- abgeschlossen (Menge), 2
- abgeschlossen (Operator), 25
- Ableitung einer Distribution, 41
- abschließbar, 25
- Abschließung (Operator), 25
- Abschluss
 - einer Menge, 2
- adjungierter Operator
 - beschränkte Operatoren, 33, 34
 - unbeschränkte Operatoren, 34, 35
- Banachalgebra, 62
- Banachraum, 9
- Banachscher Fixpunktsatz, 5
- beschränkt, 5
- Bilinearform, 66
- C^* -Algebra, 62
- Cauchyfolge, 4
- dicht, 5
- direkte Summe von Banachräumen, 11
- Distribution, 39
 - Dirac-, 40
 - reguläre, 39
 - temperierte, 91
- Dualraum
 - algebraischer, 13
 - topologischer, 10
- Dynkinsystem, 68
- Eigenraum
 - algebraischer, 27
 - geometrischer, 27
- Faltung, 83
- folgenkompakt, 7
- Fourier-Transformation
 - einer Funktion, 89
 - in L^2 , 94
 - von temperierten Distributionen, 94
- Friedrichscher Glättungsoperator, 87
- Funktionalkalkül
 - messbarer, 68
 - stetiger, 64
- Gleichung
 - Parsevalsche, 21
- Graphennorm, 25
- Grenzwert, 4
- Häufungspunkt, 4
- Halbnorm, 9
- Halbordnung, 18
- Hilbertraum, 14
- Hilbertraumbasis, 19
- Hilbertraumdimension, 22
- holomorph
 - in Banachräumen, 28
 - schwach, 28
- Homöomorphismus, 1
- Inneres einer Menge, 2
- Integral bzgl. PV-Maß, 74, 81
- Involution, 62
- Isometrie, 4
- Isomorphismus
 - isometrischer, 4
- Kern, 10
- Kette, 18
- kompakt, 6
 - folgen-, 7
 - prä-, 8
- Konvergenz von Operatoren
 - Norm-, 32
- konvex, 16
- Kugel, 3

- Lemma
 - von Urysohn, 2
 - von Zorn, 18
- lokal-endliche Überdeckung, 45
- L^p -Räume, 85
- L^p -Raum, 12
- ℓ^p -Raum, 13
- Maß
 - komplexes, 67
 - projektorwertiges, 73
 - PV-, 73
 - signiertes, 67
 - Variations-, 67
- maximales Element, 18
- Metrik, 2
 - diskrete, 3
 - Standard-, 3
- metrisierbar, 3
- Multiindex-Schreibweise, 38
- Neumannsche Reihe, 27
- Norm, 9
- numerischer Wertebereich, 58
- obere Schranke, 18
- offen (Menge), 2
 - in metrischen Räumen, 3
- offene Überdeckung, 5
- Operator
 - Ableitungs-, 24, 37
 - kompakter, 45
 - linearer, 24
 - Multiplikations-, 61, 76
 - Shift-, 24
 - Volterra-, 61
- Operatornorm, 10
- Operatortopologie
 - schwache, 32
 - starke, 32
- orthogonal, 14
- orthogonale Projektion, 70
- orthogonales Komplement, 16
- Orthonormalbasis, 19
- Parallelogramm-Identität, 15
- Personen
 - Banach, Stefan, 5
 - Hausdorff, Felix, 2
 - Hilbert, David, 14
- Polarisationsformel, 15
- Prähilbertraum, 14
- präkompakt, 8
- Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, 49
- Prinzip der offenen Abbildung, 26, 50
- Produkttopologie, 1
- Quotientenraum, 10
- Raum
 - Hausdorff-, 2
 - Hilbert-, 14
 - metrischer, 2
 - normaler, 2
 - normierter, 9
 - Prä-Hilbert-, 14
 - topologischer, 1
- reflexiv, 31
- Resolvente, 27
- Resolventenmenge, 26
- Satz
 - Approximations-, 16
 - Banachscher Fixpunkt-, 5
 - Projektions-, 17
 - Rieszscher Darstellungs-, 67
 - Sobolevscher Einbettungs-, 44
 - Spektralabbildungs-, 63, 65
 - vom abgeschlossenen Graphen, 26, 51
 - vom stetigen Inversen, 26
 - von Baire, 48
 - von Banach-Steinhaus, 49
 - von Hahn-Banach, komplex, 53
 - von Hahn-Banach, reell, 52
 - von Hellinger-Toeplitz, 52
 - von Lusin, 86
 - von Plancherel, 94
 - von Pythagoras, 15

- von Rellich-Kondrachov, 45
 - von Riesz, 17
 - von Tychonov, 8
- Schwartzraum, 90
- Segmenteigenschaft, 45
- Seminorm, 9
- separabel, 22
- Skalarprodukt, 14
- Sobolevraum, 41
- Spektralradius, 59
- Spektralsatz
 - beschränkte Operatoren, 77
 - unbeschränkte Operatoren, 81
- Spektralschar, 80
- Spektrum, 26
 - approximatives, 59
 - kontinuierliches, 26
 - Punkt-, 26
 - Rest-, 26
- stetig, 1
- Supremumsnorm, 9
- Testfunktion, 38
- Topologie, 1
 - F -schwache, 1
 - erzeugte, 1
 - lokalkonvexe, 13
 - Produkt-, 1
 - schwach-*, 13
 - schwache, 13
- topologischer Vektorraum, 11
- total geordnet, 18
- totalbeschränkt, 7
- Totalvariation, 67
- Träger einer Funktion, 38
- Umgebung, 2
- Umgebungsbasis, 2
- unbedingt konvergent, 20
- Ungleichung
 - Besselsche, 15
 - Cauchy-Schwarz-, 15
 - Erste Poincarésche, 46
 - Höldersche, 12
- Minkowskische, 12
- Zweite Poincarésche, 46
- vollständig, 5
- Wertebereich, 10